

第 2452 圖



あながやつり
一名 おほたまがやつり
Cyperus nipponicus Franch. et Sav.
(= *C. pygmaeus* Rottb. non Retz.;
Juncellus pygmaeus Clarke.)

主トシテ關東諸州ノ多少濕リタル平地ニ生ズル一年生草本ニシテ叢生シ、鬚根ヲ叢出ス。葉ハ根生ニシテ質軟ク狹線形ニシテ末漸尖シ稈ヨリ短ク、下部ハ淡赤紫色ヲ呈セル稍長キ鞘ヲ成シテ稈ヲ包ム。夏秋ノ候葉中ヨリ高サ30cm内外アル少數乃至多數ノ稈ヲ抽キテ直立乃至斜出シ三稜狀ニシテ平滑緑色ナリ、稈頂ニ開出セル長キ葉狀ノ總苞葉數片ヲ出シ、葉心ヨリ淡緑褐色ノ小穂ヲ簇出シ又時ニ二三ノ短キ繖梗ヲ出シテ其先端ニ頭狀ニ密集セル小穂ヲ着ク。小穂ハ長サ6mm内外アリテ長橢圓形或ハ狹卵形ヲ成シ二列シテ二十花許ヲ着ク。穎ハ卵形鏡頭背線緑褐色ニシテ微凸頭アリ。瘦果ハ褐色橢圓柱ニシテ背腹ノ方向ニ兩凸扁平ヲ成シ花柱二岐スルモ、住々三稜狀ヲ呈シ、又花柱三岐スル者モアリ。和名青蚊帳釣ハ其全草綠色ヲ呈スルヨリ云フ、大球蚊帳釣ハ其花穂たまがやつりヨリ大ナル故云フ。

第 2453 圖



かはらすがな
Cyperus sanguinolentus Vahl.
(= *Pycreus sanguinolentus* Nees;
C. Eragrostis Vahl.)

原野或ハ山足ノ濕地或ハ水田邊ニ生ズル一年生草本ニシテ叢生シ、鬚根ヲ叢出ス。葉ハ稈ヨリ稍短ク狹長線形ニシテ末漸尖シ、下部ハ鞘ヲ成シテ稈ヲ包メリ。稈ハ直立スレドモ其基部ハ分枝シ多少横斜シテ傾上シ高サ25-35cm許アリ。秋月、稈頂ニ長クシテ狹線形ヲ成シ開出セル葉狀總苞葉三片ノ中心ニ小穂ヲ頭狀ニ簇生シ、又短ク少數ノ梗ヲ繖出シ同ジク其先端ニ頭狀ヲ成シテ小穂ヲ着ク。小穂ハ長橢圓形扁平淡褐色或ハ紫褐色ニシテ長サ6mm内外、二列ヲ成セル二十花前後ヲ有ス。穎ハ舟狀卵形、鏡頭、淡褐色、背線緑色ニシテ時ニ兩側赤褐色ヲ帯フ。瘦果ハ兩凸面ヲ成シテ側方ヨリ壓扁セラレ圓狀橢圓形ニシテ褐色又ハ黃褐色ヲ呈シ、花柱ハ二岐セリ。此一品ニシテがやつり (var. *spectabilis* Makino = *C. Eragrostis* Vahl. var. *spectabilis* Makino) アリテ其小穂ハ多數ニシテ長サ3cm幅4mm 餘アリ相集リテ四方ニ射出シ奇觀ヲ呈セリ。和名ハ川原すがなニシテ川原ニモ生ズルヨリ云フ、而シテすがなハ多分すげくニシテ云フ意ナラン。


第 2454 圖



みつがやつり
一名 おほがやつり
Cyperus serotinus Rottb.
(= *Juncus serotinus* Clarke.;
C. Monti L. fil.; *C. japonicus* Miq.)

原野ノ沼澤・河邊・溝瀆ニ生ジ或ハ田畔等ノ濕地ニ見ル高キ多年生草本ニシテ根莖ヲ泥中ニ引キ晩秋ニ至テ其先端ニ小ナル塊莖ヲ生ジ次年萌出ノ準備ヲ成シ、株下ニ鬚根ヲ叢出ス。葉ハ一株數片アリテ長ク、長サ50-60cm 餘アリテ廣キ線形ヲ成シ末漸尖シ下部ハ鞘ヲ成ス。稈ハ葉中ヨリ直立シテ高聳シ高サ50-70cm許アリ、粗大ニシテ三稜形ヲ呈シ緑色ナリ。秋月、梢頂ニ葉狀ヲ成セル總苞葉三四條ヲ出シテ長ク開出シ長サ50cm 以上ニ達スルモノアリ、其葉中ヨリ稍粗大ナル繖梗數本ヲ出シ時ニ更ニ二三分枝シ、稍疎ニ總狀様ヲ成シテ長サ1.5cm許ノ小穂ヲ互生シテ開出ス。小穂ハ長橢圓狀線形ニシテ紫赤色或ハ茶褐色ヲ呈シ二十花許ヲ二列ニ排置ス。穎ハ黄色廣卵形鏡頭ニシテ背線緑色、兩側赤褐色ヲ帯フ。瘦果ハ黃褐色橢圓形、背腹ノ方向ニ扁平ナリ。花柱ハ二岐或ハ三岐ス。和名ハ水蚊帳釣ニシテ此種水邊ニ生ズルヨリ云ヒ、大蚊帳釣ハ草狀大形ナルヨリ云フ。

第 2455 圖



ぬまがやつり
Cyperus glomeratus L.

中部以北ノ水濕地ニ生ズル大形ノ一年生草本ニシテ多少叢生シ、鬚根ヲ叢出ス。高サ50-70cm許アリテ直立ス。葉ハ廣線形ヲ成シ末ハ長ク漸尖シ稈ト同高ニシテ質厚ク幅1cmアリ、下部ハ鞘ヲ成シテ稈ノ下方ヲ包メリ。稈ハ聳立シ粗大ニシテ三稜柱狀ヲ成シ基部ハ往々肥厚ス。秋月、稈頂ニ三乃至六片ノ長キ葉狀苞アリテ其葉心ニ數箇ノ復生ノ繖形花穂ヲ出ダシ、繖梗ハ直立シ長キハ10cmニ超ユ。穂狀花穂ハ圓柱形或ハ長橢圓形或ハ橢圓形ヲ成シテ初メ白綠色ナレドモ後テ黃褐色ヲ呈シ、密ニ多數ノ小穂ヲ着ク。小穂ハ線狀披針形ニシテ十五花内外ヨリ成リテ二列ニ排ビ、長サ5mm内外アリ。穎ハ乾皮質、長橢圓狀披針形ニシテ鈍頭、背部ハ綠色ヲ混ジ、小穂軸ニ對シ殆ンド開出セザルヲ以テ小穂ハ著クニ尖レル觀ヲ呈ス。三雄蓋アリ。蒴ハ長橢圓形ニシテ三稜ヲ成シ穎ヨリ短クシテ暗色ヲ呈シ、花柱ハ三岐ス。和名ハ沼蚊帳釣ニシテ沼地ニ生ズルヨリ云フ。

第 2456 圖



いかにやつり
Cyperus odoratus L.

(= *Pycreus odoratus* Urb.; *C. polystachyus* R. Br.; *P. polystachyus* Beauv.)

近海ノ向陽平地ニ生ズル一年生草本ニシテ叢生シ、鬚根ヲ叢出ス。葉ハ軟質ニシテ叢出シ、狹長ナル線形ニシテ末漸尖シ下部ハ鞘ヲ成シテ稈ヲ包擁ス。稈ハ一株ニ數本ヲ直立シ高サ20-30cm許アリテ葉ヨリ超出ス。秋ニ至テ稈梢ニ三乃至五條許ノ葉狀總苞葉ヲ開出シ、其葉心ニ頭狀ヲ成シテ赭褐色ノ多數小穂ヲ密集シ、更ニ二三梗ヲ出シテ梗頂ニ同ジク小穂ヲ簇着ス。小穂ハ長サ1.2cm 許アリテ線狀長橢圓形ヲ成シ先端尖リ其軸上ニ二三十花ヲ二列ニ生ズ。穎ハ舟狀ニシテ卵形、赤褐色白線ニシテ背線緑色ヲ呈シ、先端芒ヲ成サズ。瘦果ハ長橢圓形ニシテ左右ヨリ壓扁シ、褐色ニシテ表面微小粒狀突起アリ、花柱ハ二岐ス。和名ハ穉蚊帳釣ノ意ニシテ其花穂ノ狀いがノ如ケレバ云フ。

第 2457 圖



はますげ (莎草)
一名 くぐ (『倭名類聚鈔』)
Cyperus rotundus L.

海邊向陽ノ砂地ニ多ク生ジ、又原野・河岸ノ地ニ見ル多年生草本ニシテ根莖ヲ地中ニ引テ繁殖シ、其先端ニ小形ナル新塊莖ヲ生ジ、鬚根ヲ有シ肉白クシテ香氣アリ、又株本ニハノ舊塊莖アリ。葉ハ叢出シ、狹線形ニシテ末漸尖シ、質稍強硬ニシテ光滑アル深綠色ヲ呈シ、下部ハ鞘ヲ成シテ稈ヲ包メリ。夏秋ノ間、稈ヲ葉中ヨリ抽出テ直立スルコト高サ20-30cm 許、稈頂ニ狹線形ノ總苞葉二三條ヲ生ジ花穂ト參差シ、其葉心ヨリ長短數本ノ繖梗ヲ出シ、濃茶褐色線形ノ小穂ヲ稍疎ニ集メ着ク。小穂ハ長サ1.2cm 内外アリテ十數花ヲ二列ニ生ズ。穎ハ長橢圓形ニシテ舟狀ヲ呈シ、綠色背線ノ兩側ハ褐色ヲ呈ス。瘦果ハ長橢圓形ニシテ三稜狀ヲ成シ暗褐色ヲ呈シ、花柱ハ三岐セリ。古來其塊根ヲ藥用トス所謂香附子ニシテレナリ。和名濱すげハ海濱附近ノ砂地ニ多ク生ズレバ云フ、くぐハ其意明カナラズ。