


第 2518 圖

ほもの科



いぬあは

Setaria chondrachne Honda. (=Panicum chondrachne Steud.; P. Matsumurae Hack.)

原野溝邊ノ草地ニ生ズル緑色ノ多年生草本ニシテ高サ1m以上ニ及ビ通常分枝セズ。地下莖ハ横臥シ、粗大ナル側枝ヲ發出シテ地面ヲ横過シ、密ニ廣闊ナル鱗片ヲ被フル。稈ハ硬質ニシテ瘦長、平滑、基部ハ通常膝曲ス。葉ハ長クシテ線狀披針形、漸尖頭、長サ30cm内外、幅12mm餘、葉邊細縁齒ヲ有シ、長鞘ヲ有ス。秋月、稈頂ニ狭長圓錐花穂ヲ抽キ、長サ30cm内外アリ、小分穂ハ一花ト不稔花穎トヲ有シ、花下ニ長剛毛アリ。小穂ハ一花ヨリ成ル。外穎ハ甚ダ小形、内穎及ビ外稃ハ略ボ同長ニシテ芒ナク且ツ無毛ニシテ共ニ軟骨質。三雄蕊一雌蕊アリ。穎果ハ長サ凡2.5mm許。和名犬粟ハ其穂多少あハニ似テ敢テ用無ケレバズク云フ。

第 2519 圖

ほもの科



ちからしば 一名 みちしば

Pennisetum japonicum Trin. (=Gymnothrix japonica Kunth.; Cenchrus purpurascens Thunb.; P. purpurascens Makino.)

原野・路傍・土堤等ノ向陽草地ニ多ク生ズル多年生草本。力アル鬚根ヲ地中ニ下シテ抽キ去リ難キ勁剛ナル株ヲ形成シテ叢生ス。稈ハ高サ凡ソ60-70cm許アリ、細長ナル圓柱形ニシテ基部ハ通常傾上シ葉鞘ヲ以テ之レヲ包メリ。葉ハ細長ナル線形ニシテ漸尖シ幅4-7mm許、根生葉ノ基部ハ紫色ヲ呈ス。秋月、葉間ヨリ抽ク眞直ナル稈頂ニ黒紫色圓錐形ノ一花穂ヲ直立シ、通常一株ニ其數多シ、穂長17cm許アリ。小穂直下即チ花梗頂ニ多數集リテ着ク黒紫色ノ長鬚毛アリ且細毛ヲ密生シ、鬚毛ハ其長キ者凡ソ2.5cm許ニ達ス。小穂梗ハ一花ト不稔花穎ヨリ成リ、其小穂ハ一花ヨリ成ル。外穎ハ極メテ小形、内穎ハ外稃ヨリ小形、外稃ハ大ニシテ内稃ヲ包ミ、穎稃ハ總テ芒ナクセズ。三雄蕊一雌蕊アリ。一變種ニ花穂淡綠色ノ者アリテ之レヲあをちからしば (var. viridescens Matsum.) ト云フ。和名ハ力芝ノ意ニシテ此草土ニ緊着シ力強ク之レヲ引クモ容易ニ抜キ去リ難キヲ以テ斯ク云フ、路芝ハ路傍ニ多ケレバ云フ。漢名狼尾草 (蓋シ誤用乎)

第 2520 圖

ほもの科



つり糸のころ

Pennisetum latifolium Spreng.

明治年間ニ渡來セル南米うるぐあい原産ノ一年生草本ニシテ高サ1.5m内外ニ及ブ。稈ハ直立シ粗大ニシテ疎ニ分枝ス。葉ハ互生シ大ニシテ廣線形ヲ成シ鋭尖頭ヲ有シ、葉幅2cm内外アリテ細縁齒ヲ有シ、葉鞘アリ。夏秋ノ間、三四條ノ瘦長花梗ヲ葉腋ニ抽キ、梗頂ニ長毛アル圓柱狀花穂ヲ傾垂シ、其狀頗ル糸のころノ花穂ニ似タリ、穂長5cm内外、淡綠色ニシテ密花ヲ着ク。小穂ハ一花ヨリ成リ、其直下ノ短小梗ニ接スル處ニ多數ノ淡綠色鬚毛アリ、鬚毛ニハ長短アリテ其長キハ凡ソ3cmアリ。内外二穎ハ甚ダ小形、外稃ハ大ニシテ披針形ヲ成シ其長サ内外穎ノ三倍以上アリ、内外稃内ニ三雄蕊一雌蕊アリ。和名吊糸のころハ其花穂吊垂セルヨリ云フ。

うきしば

Chamaeraphis squarrosa Chase var. depauperata Masam. (=Ch. depauperata Nees.; Ch. spinescens Poir. var. depauperata Hook. fil.)

水中又ハ水邊ニ生ズル柔軟無毛ナル多年生草本ナリ。稈ハ叢生シテ四方ニ擴ガリ纖長ニシテ多ク枝ヲ分チ、水面ニ浮游シ水乾ク時ハ泥上ニ繁茂シ、長サ30-60cm許アリ。葉ハ互生シ短クシテ線形ヲ呈シ、綠色ニシテ葉鞘ト略ボ同長ナリ、而シテ葉鞘ハ稈ノ節間ヨリ長キヲ常トシ多少膨大セリ。夏秋ノ候、梢頭ニ短小ナル有梗ノ狭長圓錐花穂ヲ出シ眞直ニシテ綠色ヲ呈ス。小穂ハ一乃至二花ヨリ成リテ花穂中軸ノ各分枝ニ各一箇ヅツ着生シテ鉞狀披針形ヲ成シ、分枝ノ末端ハ皆剛毛ニ終リ宛モ有芒小穂ノ觀アリ。第一穎ハ極メテ小形、第二穎ハ最モ長クシテ尖リ、第三穎ハ披針形ニシテ刺尖ヲ有シ、第四穎ハ極メテ小形ニシテ透明質、稈モ亦透明質ナリ。和名浮芝ハ水ニ浮キテ生育スルヨリ云フ。

第 2521 圖

ほもの科



第 2522 圖

はるがや

Anthoxanthum odoratum L.

歐洲北部・北あふりか・北亞細亞原産ノ一禾本ニシテ明治初年ニ牧草トシテ輸入シ、圃ニ作リシガ、端ナク圃ヨリ逸出シテ今往々野生狀態ヲ成スニ至ル多年生草本ニシテ叢生シ、高サ35-45cm許ニシテ香氣アリ。稈ハ細長ニシテ直立シ單一ナリ。根ハ鬚狀ニシテ叢出ス。葉ハ線形ニシテ軟弱、葉鞘ハ長シ。初夏ノ候、葉ヨリ遙ニ上方ニ抽出セル稈頂ニ長形花穂ヲ立テ、長サ3-6cm許アリテ小穂ヲ密集ス。小穂ハ一花ヨリ成ル。穎ハ四片アリ、其第一穎ニ比スレバ第二穎之レヨリ大ニシテ兩者共ニ先端稍芒ト成リ、第三及ビ第四穎ハ長芒ヲ有シ其穎面ハ褐色ノ長毛ニ覆ハル、次ニ外稃内稃アリ。鱗被無シ。二雄蕊アリテ葯ハ大ナリ。子房ニ長キ二花柱アリ。穎果ハ圓柱形ニシテ尖リ、外稃内稃ニ由テ包擁セラル。和名ハ春茅ノ意ニシテ、此禾本ヲ Vernal Grass ト云フニ基キ名ケン者ナリ。

ほもの科



第 2523 圖

たかねかうぼう

一名 しらねかうぼう Anthoxanthum japonicum Hack. (=Hierochloa japonica Maxim.)

山上ノ草地ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ50cmニ達シ淡綠色無毛ニシテ質軟弱ナリ。根莖ハ細ク横斜シ鬚根ヲ下シ、多少香氣アリ。稈ハ直立シ、瘦長ナル中空ノ圓柱形ニシテ綠色ヲ呈セリ。葉ハ互生シ線形ニシテ上部漸次ニ鋭尖シ細毛ヲ布キ、長キ葉鞘アリ、小舌ハ膜質ニシテ卵形又ハ長橢圓形ヲ呈ス。夏秋ノ候、抽出セル稈頂ニ稍狭長ナル圓錐花穂ヲ成シテ通常一方ニ傾キ、短キ側枝ヲ分チテ帶褐綠色ノ小穂ヲ着ク。小穂ハ淡綠色ニシテ左右ヨリ壓區セラレ、披針形ヲ呈シテ短小梗アリ、長サ凡ソ5mm許アリテ三花ヨリ成リ二條ノ芒ヲ具フ。穎稃ハ共ニ橢圓形。雄蕊ハ三。我邦ノ學者ハ初メ之レヲはるがやト稱シ Anthoxanthum odoratum L. ノ一變種ナリト思惟セシナリ、後チはるがやヨリ此學名ノ者トシ、乃チ新ニ本品ニたかねかうぼうノ名ヲ下セリ。和名ハ高嶺春茅ノ意ニシテ嶺上ニ生ズルヨリ云ヒ、白根春茅ハ下野日光白根山ニ生ズルヨリ云フ。

ほもの科

