


第 2554 圖

ほもの科



第 2555 圖

ほもの科



第 2556 圖

ほもの科



やまあは  
Calamagrostis Epigeios Roth.  
(=Arundo Epigeios L.)

平原・山原或ハ林間ノ地或ハ近海ノ砂地  
草地等ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ  
1m内外アリ、短ク匍枝ヲ引テ繁殖ス。稈  
ハ直立シ勁質ニシテ淡綠色ノ圓柱形ヲ成  
ス。葉ハ細長ナル線形ニシテ上部漸次ニ  
鋭尖ヲ成シ、長サ20-40cm許、幅3-4mm  
許ニシテ葉面糙澁シ、細縁齒アリ。初夏  
ノ候、稈頂ニ長サ15-20cm許ノ圓錐狀圓  
錐花穂ヲ立テテ短枝ヲ分チ密ニ小穂ヲ着  
ケ淡綠色ヲ呈ス。小穂ハ一花ヨリ成ル。  
内外二穎ハ殆ンド同形同大ニシテ長サ  
6mm餘、線狀披針形ニシテ尖端尖リ、背  
脊ニ鋸齒狀毛アリ。外稃ハ其基部ニ多毛  
ヲ有シ毛ハ穎ヨリ超出スルコト無ク、且  
一ノ短芒ヲ有セリ。和名山粟ハ山地ニ生  
ジ其花穂ノ狀粟ノ如ケレバ云フ。

ほっすかや  
Calamagrostis pseudo-Phragmites  
Koeler.

(=Arundo pseudo-Phragmites Hall. f.;  
A. littorea Schrad.; C. littorea Beauv.;  
C. Onoei Franch. et Sav.)  
往々向陽ノ川原砂地ニ生ズル強壯ナル多年生草  
本ニシテ高サ100-120cm許アリ、根莖ハ横行ス。  
稈ハ粗大勁健ニシテ高く直立シ、圓柱形ニシテ  
分枝セズ。葉ハ長キ線狀ニシテ上部漸次ニ狹窄  
シテ鋭尖頭ヲ有シ粉綠色ニシテ長サ30-45cm許  
アリ、葉縁ニ細齒ヲ有シ、下ニ長葉鞘アリテ、  
小舌ハ長橢圓形ヲ成ス。夏秋ノ候、稈末ニ綠紫  
色ノ長大ナル圓錐花穂ヲ成シ、其分穗軟弱ニシ  
テ一方ニ靡キ、密ニ多數ノ小穂ヲ着ク。小穂ハ  
一花ヨリ成リ、狹尖ニシテ長サ8mm許アリ。  
内外ノ二穎ハ大小不同ニシテ狭披針形ヲ成シ上  
部長ク尖リ、外稃内稃ハ穎ヨリ短ク、外稃ノ芒  
ハ眞直ナリ。和名拂子茅ハ其花穂ノ狀拂子ニ似  
タル故云フ。

ぎょうぎしば  
Cynodon Dactylon Pers.  
(=Panicum Dactylon L.)

向陽ノ荒地・路傍・堤上・海邊ノ地等ニ生ズル多  
年生草本ニシテ常ニ平敷セル群落ヲ成シ、又海  
邊ノ者ニハ頗ル壯大ナル者アリ。稈ハ縦横ニ地  
面ニ匍匐シ、硬質ニシテ節アリ、疎ニ分枝シテ節  
ヨリ鬚根ヲ下シ、花穂ヲ出ス枝ハ直立シ10-25  
cm許ノ高サアリ。葉ハ線狀ニシテ先端尖リ、長  
サ5-10cm、幅2mm許ニシテ細縁齒アリ、稍短  
キ葉鞘アリ、大抵稈上ニ三葉相接シテ出ヅ、是  
レ稈節特ニ相逼迫シアレバナリ。初夏ノ候、直  
立セル稈頂ニ繖形ヲ成セル花穂ヲ戴キ長サ約ソ  
3-5cmアリ、枝穂ハ數條アリ、斜上シテ開出シ、  
小穂ヲ瘦穗狀ニ着ケ綠紫色ヲ呈ス。小穂ハ細小  
ニシテ一花ヨリ成ル。外穎ハ内穎ヨリ小形ニシ  
テ芒ヲ有セズ、内稃外稃ハ穎ヨリ大ナリ。雄蕊  
ハ三。子房ニ二花柱アリ。和名ハ蓋シ行儀芝ノ  
意ナランモ草體中何レヲ目標トシテ此名ヲ下セ  
シカ未詳ナリ。

かすのこぐさ  
誤稱 みのごめ

Beckmannia erucaeformis Host.  
(=Phalaris erucaeformis L.)

田面並ニ田畔等ニ多ク生ズル越年生草本ニシテ鮮  
綠色ヲ呈シ質稍軟ク且無毛平滑ニシテ高サ35-50cm許  
アリ、稈ハ叢生シ、稍粗大ニシテ中空ナル圓柱形ヲ呈  
シ、單一ニシテ節稍高シ。葉ハ廣線形ニシテ鋭尖頭ヲ  
成シ葉面糙澁シ、細縁齒ヲ有シ、長サ15-20cm許、幅  
5mm内外アリ、葉鞘ハ稈ノ節間ヨリ長シ。春日、稈頂  
ニ長キ綠色ノ圓錐花穂ヲ立テ、長サ10-20cm許、側枝  
ハ短クシテ上向シ其一側ニ二列ヲ成シ層々トシテ密  
ニ小穂ヲ排列シ一種ノ觀ヲ呈ス。小穂ハ長サ2-3mm、  
一乃至三花ヨリ成ル。内外ノ二穎ハ左右ヨリ壓扁セラ  
レ兩者同形ニシテ稍袋狀ヲ呈シ内部ニ花ヲ包ミ、熟ス  
レバ黃色ト成リテ散落ス。内稃外稃ハ小形ニシテ花ヲ  
護シ、其外稃ノ尖端ハ短ク兩穎ノ上ニ斗出ス。鱗被ハ  
二。雄蕊ハ三。子房ニ二花柱アリ。穎果ハ極メテ小ナ  
リ。和名數ノ子草ハ其小穂ノ並列セル狀宛モ餅(にし  
ん)ノ卵ニ似タルヨリ云フ、從來之レヲみのごめト呼  
ビシハ全く誤ナリシヨリ以テ予先キニ現名ヲ下シ改稱  
セシナリ、此禾本ノ穀粒ハ其外廓ヲ成セル穎ノ大形ナ  
ルニ似ズ極メテ碎小ニシテ敢テ食ニ中ルベキ者ニ非  
ラズ。漢名茵草(誤用)、滿洲國ニテ水稗子ト云フ(支那  
ノ水稗ニ非ズ)。

をひしば(牛筋草)

一名 ちからぐさ

Eleusine indica Gaertn.  
(=Cynosurus indicus L.;  
E. japonica Steud.)

原野路傍等ノ向陽地ニ普ク生ズル一年生草本ニシテ  
勁キ鬚根ニ由テ地ニ定着シ、叢生シテ綠色ヲ呈シ、高  
サ30-50cm許アリ。稈ハ直立或ハ斜上シテ疎ニ分枝  
シ、質強韌、平滑ニシテ平滑ナリ。葉ハ質強ク細長ナル  
線形ヲ成シテ漸尖シ長サ8-20cm、幅2-6mm許、平滑  
ニシテ葉縁ニ長白軟毛ヲ疎生シ、下ニ扁平ナル長キ葉鞘  
ヲ有シ、小舌極メテ短シ。夏月、稈頂ニ繖形ニ分枝セル  
綠色ノ花穂ヲ着ク、枝穂ハ長サ5-8cm許ノ穗狀ヲ成  
シ其軸ノ下半部ニ多數ノ小穂ヲ密着ス。小穂ハ扁平ニ  
シテ五六花ヨリ成リ芒無クシテ長サ6mm許アリ。外穎  
ハ内穎ヨリ稍小。外稃内稃ハ中ニ兩性花ヲ護シ、其ニ  
内穎ト稍同形同長ナリ。和名雄日芝ハ雌ひしばニ對シ  
テ呼ビ、ひしばト蓋シ夏ノ烈日ヲ意トセズ盛ニ繁  
茂スルヨリ斯ク云フナラン、力草ハ其根強クシテ拔キ  
去リ難キヨリ云フ。漢名、植物名實圖考ノ水稗(同名  
アリ)ハ本種ナリ。

しこくびえ(稔・龍爪粟)

一名 こうばふびえ

Eleusine indica Gaertn.  
var. coracana Makino.  
(=Cynosurus coracanus L.;  
E. coracana Gaertn.)

元來外來ノ品ニシテ蓋シ往時隣國支那ヨリ渡セシ者  
ナラン、通常山畑ニ栽植セルルル一年生草本ニシテ全  
草頗ル強健、高サ60-90cm許アリ、概形をひしばニ似  
タリト雖モ總テ大形ナリ。稈ハ直立シ、粗大ニシテ強  
韌、平滑ニシテ綠色ナリ。葉ハ長クシテ線形ヲ成シ上  
部長ク漸尖シ、長サ40cmニ及ビ幅7mm内外アリテ平  
滑綠色ナリ。夏日、稈頂ニ繖形ノ花穂ヲ着ケ、其枝  
穂ハ長サ7-10cm許、幅1cm許アリテ往々内曲シ、其穗  
軸ノ下側ニハ二列ニ併ベル小穂ヲ密ニ着ケ、綠色ヲ呈  
セリ。小穂ハ無柄ニシテ扁平シ長サ7mm許ニシテ五  
六花ヨリ成リ、芒ヲ有セズ。外穎ハ内穎ヨリ小。外稃内  
稃ハ兩性花ヲ護シ、鱗被ハ二。雄蕊ハ三。子房ニ二花  
柱アリ。穎果即チ穀粒ハ稍大ニシテ球形ヲ成シ熟スレ  
バ黃赤色ヲ呈シ、收メテハト同ジク食料ニ供シ又牛  
馬並ニ鳥ノ飼料トス。和名四國稗ハ四國地方ニ作リア  
リシヨリ云ヒ、弘法稗ハ、弘法大師ハ民ヲ救フ爲ニ説  
教シ努力セシ佛僧ナレバ乃チ此民益アル穀草ヲ斯ク  
稱ヘシ者ナリ。

第 2557 圖

ほもの科



第 2558 圖

ほもの科



第 2559 圖

ほもの科

