

第 2566 圖

ほもの科



かにつりぐさ
Trisetum bifidum Ohwi.

(= *Bromus bifidus* Thunb.;
T. flavescens Beauv. var. *bifidum* Makino;
T. flavescens Beauv. var. *papillosum* Hack.;
T. cernuum A. Gray.)

各地ノ草原路傍ニ多キ多年生草本。稈ハ少数簇生シ基部膝曲スレドモ上部ハ直立ス。葉ハ線狀披針形ニシテ莖ノ下半ニ多ク着キ長サ5-15cm、裏面平滑、表面ハ寧ロ有毛ナレド、下部ノ葉ニテハ鞘ト共ニ多毛ト成ル。四五月ノ候、稈頂ニ廣楕圓様ノ圓錐花叢ヲ成シ、多少横ニ傾キ初メ緑紫色ヲ呈スレドモ後チ黄褐乃至緑褐色ニ變ジ一種ノ光澤アリ。分枝ハ初メ開出スレドモ後チニ立チテ互ニ相接シ、細クシテ稍密ニ小穂ヲ着ク。小穂ハ三四花ヨリ成リ最上ノ一花ハ普通不稔性。外穎ハ線狀披針形ニシテ小、一脈アリ。内穎ハ遙ニ長ク、長サ5mm許ノ狭長橢圓形ニシテ三脈ヲ有シ、上半邊緣白膜質或ハ紫染ス。外稃ハ長橢圓様披針形ヲ呈シテ穎ヨリ少シク超出、背面圓味ヲ帯ビ全面ニ細刺毛アリテ粗糙シ、先端ニ裂シ背面ヨリハ長芒ヲ開出ス。雄蕊三。和名蟹釣草ハ小兒其稈ヲ以テさはがにヲ釣リ遊ブ故ニ斯ク云フ。

第 2567 圖

ほもの科



りしりかにつり
一名 たかねかにつり
Trisetum subspicatum Beauv.
(= *Aira subspicata* L.; *A. spicata* L.;
T. spicatum Richt.)

中部以北ノ高山草原ニ生ズル多年生草本。稈ハ基部膝曲スレドモ直立シテ簇生シ、高サ20-30cm、全株白軟毛ヲ被フル者多シ。葉ハ稈ノ下部ニ互生シ、葉片ハ5-10cm、線狀長披針形ニシテ立チ、先端尖ル。小舌ハ廣卵圓形、邊緣細裂ス。六七月ノ候ニ至リテ梢頭ニ一見穂狀様ノ花穂ヲ直立シ、花穂直下ノ花莖ハ白毛ヲ密生スル者多シ。穂長4-6cm許アリテ分枝直立スル爲メ穂容圓柱形ヲ呈シ初メ緑色後チ黄褐乃至緑褐色ト成ル。小穂ハ殆ンド梗無ク二三花ヨリ成リ特異ノ光澤ヲ有ス。穎ハ外者少シク短ク長橢圓形ニシテ鋭頭、上部薄膜縁ナリ。外稃ハ長サ6mm許、狭長ノ舟形ニシテ先方針狀ニ鋭尖シ其先端僅ニ二裂シ、背面中央上部ヨリ芒ヲ開出ス。表面ハ多少粒狀ヲ呈シ粗糙ナリ。芒ハ長サ6mm許、振レ且膝曲ス。和名ハ最初ノ採集地北海道利尻島ニ基ツキ、高嶺蟹釣ハ高山ニ生ズルヨリ云フ。

第 2568 圖

ほもの科



おほかにつり
Arrhenatherum elatius
Mert. et Koch.
(= *Avena elatior* L.; *Arrhenatherum avenaceum* Beauv.)

歐洲ノ原産ニシテ明治初年牧草トシテ輸入シ爾後栽培セル多年生草本ニシテ往々圃ヨリ逸出シテ野生狀ト成リ、高サ60-90cm許アリ。稈ハ直立シ節間ハ長クシテ無毛。葉ハ線狀長披針形ヲ成シ長サ15cm内外、裏面無毛ナレドモ、表面却テ裏面様ヲ呈シ有毛、粗糙ス。五六月ノ候、稈頂ニ長大ナル穂様ノ圓錐花叢ヲ着ク。分枝ハ纖細、小穂ハ長サ8-9mmニシテ淡綠乃至淡黄褐色、直立ス。小穂ハ二花ヨリ成リ上花ハ兩全無芒、下花ハ雄性有芒、芒ヲ除キテ共ニ穎内ニ包マル。穎ハ内方ノ者大ニシテ卵狀橢圓形鋭頭膜質三脈アリテ無毛。下花ノ外稃ハ長橢圓形ニシテ尖リ基部ニ近キ背面ヨリ穎ノ二倍長アリテ其中邊膝曲セル長芒ヲ派生ス。園藝品ニリぼんざさぐらナナル一變種 (var. *bulbosum* Koch.) アリテ根莖ちよろぎ狀ヲ成ス故ニちよろぎガヤノ稱アリ、葉ニ白條アリテ美ナリ。

みのぼろ

Koeleria tokiensis Domin.
(= *K. cristata* Miq.)

原野ノ草地等ニ生ズル多年生草本。根莖ハ短ク分岐シテ稈葉叢生シ、高サ30-50cm許アリ。葉ハ狭線形ニシテ稈ノ下部ニ多ク、稍剛質ニシテ糙澁ス。葉鞘ハ無毛、小舌ハ卵圓形ニシテ邊緣櫛齒裂ヲ成ス。稈ハ細長ナル圓柱形ニシテ直立シ、白軟毛ヲ生ジ、花穂ニ近ヅクニ從ヒ最モ多毛ト成ル。五月、稈頂ニ廣線狀穗様ノ圓錐花叢ヲ直立シ淡綠色ヲ呈ス。小穂ハ長サ4-5mm、披針形ヲ呈シテ芒ナシ。外穎ハ線狀倒披針形、先端鋭尖シテ短芒狀ニ突出シ、内穎ハ稍長ク且ツ廣ク、橢圓形ヲ呈シ、兩者共ニ中脈隆起シテ微刺ヲ生ズ。外稃ハ穎ヨリ僅ニ長ク披針狀長橢圓形、顯著ノ縁脊ヲ成シ、脈上糙澁シ、先端ハ鋭尖ス。雄蕊ハ三箇。和名みのぼろノみのハ篋ニテ其集リシ花穂ヲみのニ擬シタルモノナラン、ぼろハ其亂雜ナル形容ヲ謂ヒシナラン。

第 2569 圖

ほもの科



こぼんさう

一名 たはらむぎ
Briza maxima L.

歐洲原産ナレドモ明治年間ニ渡來シ觀賞品トシテ栽培セルルル一年生草本。高サ30-40cm、稈ハ細クシテ直立シ上部ニ至テ甚ダ細シ。葉ハ立チテ線狀長披針形ヲ成シ長サ8-12cm許アリテ多少糙澁シ、葉鞘ハ無毛。小舌ハ卵形、先端ニ三剪裂ス。六月、稈頂ニ疎ナル圓錐花叢ヲ生ジ、極メテ細キ少數分枝ノ先端ニ顯著ナル小穂ヲ下垂ス。小穂ハ扁壓セル厚キ卵狀橢圓體ニシテ長サ1-2cm、幅1.2cm内外ニ達ス。初メ綠色、熟シテ黄褐色ヲ呈ス。十五花内外左右ニ並ビ、廣大ナル外稃ハ顯著ニシテ鱗次シ上半部ニハ毛茸ヲ被ル。内外ノ二穎アリテ外稃ト同様ナリ。外稃ハ廣卵圓形長サ8mm内外、左右ヨリ疊マレテ圓背ヲ成シ深心臟底。内稃ハ外稃ニ比スレバ大小懸絶シテ甚ダ小。和名小判草并ニ依麥ハ共ニ花穂ノ形狀ニ基キシ稱ナリ。

第 2570 圖

ほもの科



ひめこぼんさう

一名 すずがや
Briza minor L.

元來歐洲ノ原産ナレドモ今ハ西南各地ノ原野路傍ニ生ズル全體綠色ノ一年生草本ニシテ叢生シ高サ30-40cm許アリ。稈ハ細クシテ立チ、葉ハ稈上疎ニ互生シ狭長橢圓様披針形ニシテ長サ6-14cm、幅5-10mmヲ算ス。質軟クシテ稈ト共ニ無毛、先端ハ尖リ、基部ハ斜ニ葉鞘ニ流ル。小舌ハ卵狀披針形ナリ。夏日、稈頂ニ長サ10cm内外ノ圓錐花叢ヲ着ケ、特異ナル多數ノ小穂ヲ絲狀ノ分枝上ニ生ズル様頗ル愛スベシ。小穂ハ同屬ノこぼんさうニ類シテ遙ニ小形、長サ4mm許、扁壓ノ三角狀卵形ニシテ綠色平滑ナリ。十花内外ノ外稃左右ニ鱗次シ、穎ト外稃ト同形ニシテ底部ハ心臟形ヲ呈ス。和名ハ姫小判草ノ意、鈴ガヤハ亦其小穂ノ形容ニ由ル。

第 2571 圖

ほもの科

