

第2590圖



第2591圖



ほもの科

みぞいちごつなぎ

Poa acroleuca Steud.

隨處ノ陰地溝瀆畔或ハ湿地ニ生ズル越年生草本ニシテ疎ニ叢生シ高サ40-50cm許アリ、全體深緑色ヲ呈シ柔弱ナリ。稈ハ下部ハ膝曲シ上部ハ直立シ、瘦長ニシテ平滑ナリ。葉ハ線形ニシテ漸尖シ、平開或ハ斜開シ多少糙澁シ質薄柔ナリ、小舌ハ顯著ニシテ鈍頭剪裂、葉鞘ハ平滑且ツ上部ハ扁壓、劍脊ヲ呈ス。五六月、稈頂ニ疎ナル圓錐花叢ヲ着ケ長サ20cm内外ノ長橢圓形ヲ成シ、分枝ハ絲状ニシテ多少糙澁シ各節ヨリ二條平出シテ相隔タリ、其上半ニ下向シテ小穗ヲ着クト雖モ花時ニハ上向ス。小穗ハ卵形、長サ3-4mm、五六花ヨリ成リ綠色ナリ。外穎ハ卵狀披針形、白膜緣一脈、内穎ハ稍長クシテ卵狀漸銳頭三脈ヲ存ス。共ニ脈上ニ少許ノ微齒ヲ有ス。外稃ハ舟形、長橢圓形ニシテ先端ハ白膜質ノ鈍頭、五脈アリテ隆起シ、全面ニ白鬚毛ヲ疎ニ布ク、熟シテ穎果ヲ包ミタルママ容易ニ脱落ス。和名溝苔繫ハ此種通常溝邊ニ多ク生ズレバスク云フ。

いちごつなぎ

一名 かはらいいちごつなぎ・ひめいちごつなぎ・ざらつきいちごつなぎ

Poa sphondylioides Trin.var. *strictula* Koidz.(=*P. strictula* Steud.; *P. palustris* L. var. *strictula* Hack.)

向陽ノ路傍・土堤・河原等ニ多ク生ズル多年生草本ニシテ往々密ニ叢生シテ大株ヲ成シ高サ50-70cm許アリ、其株多ヲ罹死セズ。稈ハ林立シ瘦長硬質、葉ト共ニ深緑色ヲ呈シ直立シ平滑ナレドモ花穗下ニ在テハ糙澁ス。葉ハ狹線形、眞直ニ開出或ハ斜開シ長サ10-15cm幅2mm以下、質稍柔カク邊緣ハ糙澁ス。五月、稈頂高ク淡綠色ノ細長圓錐花叢ヲ直立シ、長サ10-15cm、分枝ハ各節四五出、繩細ニシテ立チ糙澁ス。小穗ハ長サ4-5mm、橢圓狀卵形ニシテ四五花ヨリ成ル。穎ハ長橢圓狀披針形ニシテ鈍尖頭、長サ稃ニ超エ、三脈ヲ有シ全面ニ微刺アリ。稃ハ舟形ニシテ長橢圓形短銳頭、上部白膜緣、中脈隆起シテ鬚毛ヲ生ジ、其他ハ鏡下ニ微粒ヲ布クヲ見ル。和名苔繫ハ村童さがりいちごノ實ヲ採リ此稈ニ貫ク故斯ク云ヒ、河原苔繫ハ此種河原邊ニ多ケレバ云フ、又ざらつき苔繫ハ其花穗下ノ稈ニ觸レバ殊ニ糙澁スルヲ以テ云フ。

第2592圖




ながはぐさ

Poa pratensis L.

明治初年牧草トシテ歐洲ヨリ渡來シ、今ハ各地林野ニ野生ノ状態ト成レル多年生草本ナレドモ此種ハ又我邦ニモ自生アリ、高サ50-70cm許ニシテ通常多數叢生シ參差林立シ特徴アル景觀ヲ呈ス。根莖アリテ地中ヲ横行シ處々ニ苗ヲ生ズル特徴アリ。稈ハ細長眞直、綠色無毛平滑ナリ。葉ハ狹線形ニシテ稈ノ下半部ノミニ出デ、長サ15-30cm アレド幅3mmニ満タズ、鈍端ニシテ深綠色ヲ呈シ邊緣稍糙澁シ、表面ニ多少ノ光澤ヲ存ス。五六月ノ候、稈頭高ク長サ10cm許ノ綠色圓錐花叢ヲ抽ク。分枝ハ各節二乃至五箇、斜上シ糙澁ス。小穗ハ卵形、長サ4mm許、綠色或ハ紫采アリ。穎及稃ノ形状ハいちごつなぎニ類スレド、外稃ノ鬚毛ハ邊緣中部以下ニノミ限ラル。和名長葉草ハ其葉特ニ長ケレバ云フ。

第2593圖



ほもの科

みのごめ(蘭草)
一名 むづをれぐさ・たむぎ 古名 みの
Glyceria acutiflora Torr.
(=*Hemibromus japonicus* Steud.;
G. japonica Miq.)

邦内諸州ノ水田廢田或ハ溝中ニ繁茂スル越年生草本ニシテ叢生ス。秋日既ニ株本ヨリニ三條ニ分レ其葉ハ線形狭長ニシテ紅紫采シ質軟薄ニシテ水面ニ浮ビ以テ越冬シ、春到レバ稈ハ更ニ叢生シ或ハ泥上ニ横ハリテ之曲シ各節ヨリ枝桿及ビ鬚根ヲ發シ、其本稈并ニ枝桿ハ斜上シテ高サ50cm内外ト成ル。葉ハ互生シ線形ニシテ尖リ長サ5-10cm許アリテ平滑ナリ、小舌ハ白膜質ニシテ廣ク圓頭ヲ成シ、葉鞘ハ完全ナル筒狀ナリ。五月、稈頂ニ細長ナル綠色ノ花穂ヲ立テ、分枝ハ小穗ト共ニ直立スルヲ以テ見一狹種ノ如シ。小穗ハ線狀圓柱形ニシテ長サ3cm内外、八九花規則正シ互生シテ鱗次シ熟スレバ極メテ脱落シ易ク遂ニ唯稈軸ヲ残スニ至ル。穎ハ内者闊大長サ3.5mm、卵形膜質ナリ。外稃ハ卵狀披針形、長サ7-8mm、漸尖頭、上部膜緣、穎下ニ微刺ヲ布ク。内稃ハ外稃ヨリ上ニ超出シ、先端燕尾狀ニ二裂ス。穎果ハ長橢圓形、稍大形平滑綠色、曉民往々之レヲ集食ニ充ツ。從來かすのこぐさヲみのめト爲セシハ大ナル誤ナリ。和名みのめハみの米ノ意、此草ヲみのト稱スル義ハ不明ナリ、むづをれぐさハ蓋シバラバラに折レ易キシテ其脱落シ易キ穂ニ基キテ謂ヒシナラン、田麥ハ田ノ麥ノ意ニシテ其食シ得ベキ穂粒ニ基キテ云フナリ。

ごちゅうつなぎ
Glyceria tonglensis Clarke.
(=*G. caspia* A. Gray.)

溝側・水邊竈ニ水湿地ニ生ズル多年生草本ニシテ叢生シ、質稍軟ニシテ平滑無毛、高サ40-60cm許アリ。稈ハ下部膝曲シ、上部傾上、通常徑3mm内外ナレド往々壯大ノ者アリ。葉ハ線形ニシテ長サ15-20cm、幅4-5mm、先端ニ至リテ急ニ細ク尖リ多少粗糙ノ感無キニ非ラズ、小舌ハ半圓形、葉鞘ハ緣端ニ耳狀ノ附屬物ヲ有シ且ツ完筒ヲ成ス。五六月ノ候、稈頂ニ長キ圓錐花叢ヲ抽テ細小多數ノ綠色小穗ヲ着ケ往々濃紫采アリ。小穗ハ廣線形ニシテ長サ6mm内外、小ナル五六花正シク左右ニ並ビ、小穗中軸ハ細クシテ小穗間ニ波曲ス。穎ハ小形ニシテ膜質透明、内穎ハ外穎ヨリ大ニシテ長サ1mm許、卵形ヲ成ス。稃ハ廣卵形、背部圓ク七脈顯著ニ隆起シ頭ナレド鈍端、芒ナク長サ2mm許アリ。和名泥鰌繫ニシテ小兒捕ヘシ小魚ノどぢやうヲ其稈ニ刺シ貯テ持ツ故ニ云フ。

第2594圖



ほもの科

第2595圖



ほもの科

ひろはのごちゅうつなぎ
Glyceria aquatica Wahlgren.
(=*Poa aquatica* L.)

我邦中部以北山地ノ水傍ニ生ズル壯大ナル多年生草本ニシテ高サ1-1.5m許アリ。根莖ハ甚ダ短形ナレドモ匐枝狀ヲ成セル分枝ヲ發出ス。稈ハ大ニシテ直立シ平滑ナリ。葉ハ廣線形ニシテ先端尖リ長サ30cm、幅8mm内外ニシテ兩面糙澁シ、葉鞘ハ完筒ヲ成シ平滑ニシテ口部ノ小舌ハ低平截頭ナリ。七八月ノ間、稈頂ニ長サ20cm許ノ大ナル圓錐花叢ヲ成シテ密ニ多數小形ノ小穗ヲ着ク。分枝ハ細クシテ斜開シ下垂スルコトナク、糙澁甚ダシ。小穗ハ卵狀橢圓形ニシテ長サ7mm内外、五六花ヨリ成リ淡綠色、往々褐紫采アリ。穎ハ膜質長卵形ニシテ稈ヨリ短シ。外稃ハ長橢圓狀披針形ヲ呈シ長サ3mm内外、五脈隆起シ、銳頭鈍端ナリ。内稃ハ外稃ヨリ僅ニ長シ。和名ハ闊葉の泥鰌繫ニシテ此類中他ヨリ其葉闊キヲ以テ斯ク云フ。