


第 2608 圖

ほもの科




おほむぎ (大麥)
古名 ふとむぎ・かちかた
Hordeum vulgare L.
var. *hexastichon Aschers.*
(= *H. hexastichon L.*)

上古=我邦=入り今ハ廣ク各地ノ圃ニ栽培スル越年生草本ニシテ極メテ重要ナル作物ナリ。稈ハ高さ1m内外アリ、直立シテ中空ナル圓柱形ヲ成シ平滑緑色ニシテ節稍高ク、節間ハ稍長シ。葉ハ互生シ、葉片ハ廣線狀長披針形ニシテ漸尖シ幅10-15mm、平滑ニシテ緑色多少霜白色ヲ帯ビ、葉質剛ナレバ彎曲下垂スルコトナク、葉底ニハ稈ヲ抱ケル白色半月形ノ兩耳片アリテ小舌ハ短ク、葉鞘ハ緑色無毛ニシテ稈ヲ包ンデ緩カナリ。四五月、葉上ニ抽ク稈頂ニ長さ5-8cm許ノ粗大圓柱形ノ穗狀花叢ヲ直立ス。小穂ハ三個ヅツ一團ヲ成シテ中軸ノ左右ニ並ビ、一見六條ノ小穂列ヲ現ハス。小穂ハ長さ1cm未満ノ卵狀披針形ニシテ殆ンド柄無ク、一花ヨリ成ル。穎ハ二條アリテ小ナル針形ヲ呈シ小穂ノ外方ニ位ス。外稈ノ通常其頂ニ長芒ヲ生ズレド又時ニ無芒(ぼうずおほむぎ)ナリ。三雄蕊アリ。穎果ハ食料トシ稈ノ諸用ニ供ス。一變種ニはだかむぎ即チ裸麥 (var. *nudum Hook. f.* = *H. nudum Ard.*; *H. coeleste Koern. et Wern.*)ハ穀粒容易ニ穀ヲ脱スルノ特性アリテ中部以西諸州ニ普通ニ作ラルル麥ナリ。むぎノ語原ニ種々アリテむぎ(剣)ノ意ト謂ヒ、もえぎ(萌芽)ノ約ト謂ヒ、或ハむれれ(群芒)ノ略ト謂ヒ一定セズ、又む(實)け(禾)ノ轉呼ナリトモ謂ヘリ。

第 2609 圖

ほもの科



やばねおほむぎ
一名 やばねむぎ・さなだむぎ
Hordeum vulgare L.
var. *distichon Alefeld.*
(= *H. distichon L.*)

おほむぎノ一變種ニシテ蓋シ明治初年ニ我邦ニ渡來シ今ハ諸處ノ圃ニ栽培セラルルもおほむぎニ比シテ多カラズ、而シテ其外觀おほむぎト異ナラズト雖モ稈頂ニ葉ハ稍帯白色ヲ呈シ節ノ邊々々紫色ヲ帯ブ。稈ハ直立シテ高さ1mヲ超エ、葉ハおほむぎノ葉ト相同ジ。花穂ハ稈頂ニ立チテ扁平ナル廣線形ヲ呈シ長さ7-10cm許アリテ規正ニ排列セル二列生ノ有花小穂ヲ有シ長芒ヲ有ス。芒ハ花穂ヨリモ長ク、平行シテ立チ穗體ト共ニ矢羽狀ヲ呈シ顯著ナリ。三箇ヅツ集團セル小穂ノ内兩側ノ者ハ雄性或ハ不稔性ヲ呈シ發育セズシテ萎縮シ、唯中央ノ者ノミ發育シテ兩性花ヲ成シ結實ス。穎ハ線形ニシテ有毛、外稈ハ平滑ニシテ長芒ヲ有スル點おほむぎト相同ジ。穀粒ノ食料ニ供スルコト亦おほむぎニ於ケルガ如シ。和名矢羽大麥、矢羽麥ハ其穗形ノ矢羽即チ箭羽ニ似タル故云ヒ、又眞田麥ハ同ジク其穗ヲ眞田紐ニ擬シテノ稱ナリ。

第 2610 圖

ほもの科



やまかもじぐさ
Brachypodium miserum Koidz.
(= *Festuca misera Thunb.*; *B. japonicum Miq.*; *B. sylvaticum Miq.*)

山地或ハ山足等ニ生ズル多年生草本ニシテ叢生ス。稈ハ細長ニシテ基部ハ往々膝曲シ、節ニハ密毛ヲ有シ、葉ト共ニ傾垂シ長さ30-50cmアリ。葉ハ疎ニ互生シ、狭長披針形ニシテ漸尖シ稍淡綠色ヲ呈シ、通常裏面ヲ上向シテ上半部ニ多クハ兩面ニ散毛ヲ生ズ、葉鞘ハ長ク多クハ密ニ開出毛ヲ生ズ。六七月ノ候、稈頂ニ貧弱疎疎ナルかもじぐさ様ノ花穂ヲ斜垂ス。小穂ハ穗軸上ニ四五箇、疎ニ軸上ニ互生シ、極メテ短キ柄ヲ具ヘ、線狀紡錘形ニシテ兩端細狹窄シ綠色ニシテ長さ25-30mm許アリ、六乃至八花ヨリ成ル。穎ハ外稈ニ似テ細小、外穎ハ短シ。外稈ハ長橢圓形ノ舟形、先端ハ急ニ鈍形ト成リテ芒ヲ成シ邊緣ニハ剛毛列生ス。かもじぐさニ似テ全株矮小、小穂ハ短柄ヲ有シ其數少且ツ疎ナレバ直ニ區別シ得。和名ハ山髭草ニシテ此種山地ニ生ジかもじぐさニ似タレバ斯ク云フ。

第 2611 圖

ほもの科



かもじぐさ (燕麥・驚麥)
一名 なつのちゃひきぐさ・ひなぐさ・
からすむぎ(同名アリ)

Agropyrum semicostatum Nees.

原野路傍ニ極メテ多キ粗大ナル越年生草本ニシテ叢生シ、冬季ニハ綠色ノ嫩葉ノミニ布テ生ズ。稈ハ其基部膝曲伏臥スレドモ上部ハ斜上シテ高さ50-70cm許ヲ算シ、多少粉白狀ヲ呈ス。葉ハ線狀披針形ニシテ漸尖シ幅15mm内外、質稍厚クシテ上部彎曲下垂シ、無毛ニシテ多少ノ蒼白色ヲ帯ブ。初夏、稈頂ニ帶紫綠色ニシテ且霜白色ヲ呈スル花穂ヲ抽キテ一方ニ傾垂スルコト長さ20cm内外。小穂ハ花穂ノ中軸上ニ二列ニ並ビテ互生シ其數十乃至十五、多少疎ニ着キ柄ナク、長さ芒ヲ除キテ2-2.5cm、稍壓扁セル紡錘狀長長橢圓形ヲ成シ數花ヨリ成ル。穎ハ細クシテ内外同長、稈ハ銳尖頭、汚紫色ノ長芒アリ。内稈ハ長橢圓形、長サ外稈ニ等シク、熟スレバ内ニ穎果ヲ包ミテ脱落ス。和名鬚草ハ女兒其臭アル嫩葉ヲ採リ揉ンデ女ノ雛人形ヲ作り遊ブ故斯ク云ヒ、由テ又雛草ノ名アリ、からすむぎハ之レガ漢名燕麥ニ基キシ稱ナリ、夏ノ茶挽草ハ初夏ニ花穂ヲ出ス故斯ク呼ブ。

第 2612 圖

ほもの科



あをかもじぐさ

一名 けかもじぐさ

Agropyrum ciliare Franch.

(= *Triticum ciliare Trin.*;

A. semicostatum Nees

var. *ciliare Hack.*)

山野或ハ路傍ニ普通ナル越年生草本ナリ。高さ60-90cm許。概形かもじぐさに酷似シ、初夏ノ候、長大ナル花穂ヲ稈頂ニ出シテ能ク下垂シ、通常緑白色ヲ呈シ、小穂ノ穎并ニ稈ニ著シキ粗毛又ハ密毛アルヲ以テ異ナリトス。又雌雄蕊ヲ抱ク内外二片ノ稈ハ其長サヲ異ニシ、又盛夏ヲ過ギテ穂漸ク枯ルル頃ニ至レバ其芒著シク反曲スルノ特徴アリ。和名青鬚草ハ其花穂綠色ナレバ云ヒ、毛鬚草ハ其穎稈ニ著シク毛アルヲ以テ斯ク云フ。

第 2613 圖

ほもの科



えぞむぎ

一名 ほそてんき

Elymus sibiricus L.

我邦中部以北ノ山麓原野ニ生ズル多年生草本ニシテ叢生シ高さ90cm内外ニ達ス。稈ハ細長ニシテ直立シ綠色ヲ呈シ平滑ナル圓柱形ヲ呈ス。葉ハ線狀披針形ニシテ漸尖シ葉末并ニ邊緣糙澁シ無毛ニシテ稍帯白色ヲ呈ス。七八月ノ候、稈頂ニ長さ15-20cm許ノ綠色花穂ヲ抽キ弓狀ヲ成シテ一方ニ傾垂シ、其狀稍かもじぐさに類シ、花穂中軸ハ平扁ニシテ細毛アリ。小穂ハ穗軸ノ各節ニ二箇宛相接シテ着キ長さ10-15mm許、三乃至數花ヨリ成ル。穎ハ狭長ニシテ尖リ三脈ヲ有ス。外稈ニ五脈アリテ且2cm内外ノ長芒ヲ具ヘ糙澁ス。和名ハ蝦夷麥ニシテ北海道ニモ生ズルヨリ云ヒ、細てんきハてんき即チくさどうニ似テ小ナルヨリ云フ。