

第268圖



うり科

とうぐわ (冬瓜)

一名 かもうり

Benincasa hispida Cogn.

熱帶ノ原產ニシテ畑ニ栽培スル一年生攀緣草本。莖ハ卷鬚ヲ具ヘ、長ク延ブ。葉ハ通常淺ク缺刻ヲ有シ、掌狀ヲ成ス。夏日黃色ノ雌雄花ヲ同株ニ開キ、合瓣ニシテ五裂ス。花梗又ハ下位子房等ニ毛多シ。漿果ハ大ニシテ圓形或ハ橢圓形ヲ成シ、大ナルハ徑30-50cmニ及ブ。嫩果ハ全面軟毛ニ被ハルルモ、熟セバ脱落シ蠟白粉ヲ帶ブ。果實ヲ食用ニ供ス。又民間藥トシテ效用多シ。和名ハ冬瓜ニ基ク、かもうりハ毛アル故名ク、かもハ蕪ナリ。

第269圖



うり科

きうり (胡瓜)

Cucumis sativus L.

南あじあ原產ノ一年生草本ニシテ普ク菜園ニ栽培セラル。蔓莖ハ卷鬚ヲ以テ攀緣シ、長ク延ブ。葉ハ有柄互生シ、掌狀淺裂ニシテ、裂片ハ銳尖三角形ヲ成シ、邊緣ニ微尖齒ヲ具ヘ、毛アリテ糙澁ス。夏日黃色ノ雌雄花ヲ同株ニ生ジ、花冠ハ五裂シテ皺アリ。雌花ハ花下ニ長形ノ子房アリテ刺毛ヲ有ス。漿果ハ圓柱形ニシテ、嫩キ時表面ニ小刺ヲ散布ス。果實ヲ食用ニ供ス。果汁ハ湯火傷ニ妙効アリ。和名ハ黃瓜ノ意、此瓜黃熟ス故ニ此名アリ。

第270圖



うり科

しろうり (越瓜)

*Cucumis Melo L.*var. *Conomon Makino*.

熱帶ノ原產ナルまくはうりノ一變種ニシテ、廣ク園圃ニ栽培スル一年生ノ攀緣草本。莖ハ長ク延ビ、卷鬚アリ。花・葉ノ狀まくはうりト同ジ。果實ハ圓柱狀長橢圓形ニシテ長徑20-30cmニ達シ、外皮ハ平滑ニシテ白綠色ヲ帶ブ、之レヲ生食スト雖ドモ通常主トシテ奈良漬トス。あをうりハ此一品ニシテ其果實ノ用途相同ジ。和名ハ其瓜ノ表皮白綠色ナルニ基ク。

まくはうり (甜瓜)

*Cucumis Melo L.*var. *Makuwa Makino*.

南あじあノ原產ニシテ、園圃ニ栽培スル一年生草本。莖ハ卷鬚ヲ有シ、蔓性ニシテ長ク地上ニ延ブ。葉ハ有柄互生シ、掌狀淺裂ニシテ葉底心臟形ヲ呈ス。夏日黃色ノ雌雄花ヲ同株ニ生ジ、花冠五裂シテ大ナラズ。雌花ハ下部ニ子房アリ。漿果ハ通常圓柱狀橢圓形ヲ成シ、黃綠色ニ熟シ、一種ノ香氣有リテ味甘シ。熟果ヲ生食シ、未熟ナルモノヲ催吐劑ニ用キラル。和名ハ昔美濃真桑村ニ作ルモノ上品ナリシ故斯ク名ケシナリ。ますくめろんハ此一品ニシテあみめろんノ和名アリ。

第271圖



うり科

すいくわ (西瓜)

Citrullus vulgaris Schrad.

熱帶あじあ原產ノ一年生草本ニシテ、園圃ニ栽培ス。蔓莖ハ分岐セル卷鬚ヲ有シ、長ク延ビテ地上ニ匍フ。葉ハ有柄、互生シ、波狀ニ深裂シテ稍羽狀ヲ成シ、葉色稍白ヲ帶ブ。夏日淡黃色ノ有梗雌雄花ヲ同株上ニ開キ、花冠ハ小ニシテ五深裂ス。漿果ハ大形ニシテ、球形或ハ橢圓形ヲ呈シ、皮色種々アリ。果肉ハ頗ル多汁ニシテ通常赤色、時ニ黃色ノモノアリ。普ク食用トスル他民間藥ニモ供セラル。和名ハ西瓜ノ唐音ノ轉化セシモノナリ、故ニ和名ヲ上ノ假名トセリ。

第272圖



うり科

第273圖



うり科

ころしんとうり

Citrullus colocynthis Schrad.

熱帶あじあ・あふりか原產ノ多年生蔓草ニシテ糙澁毛アリ。花葉頗ルすいくわニ類ス。兩岐セル卷鬚ニヨリ他物ニ攀緣ス。同株上ニ黃色ノ有梗雌雄花ヲ生ジ、五裂セル合瓣花冠ヲ有ス。果實ハ球形ニシテ黃熟シ、徑10cm内外、味極テ苦シ。乾果ヲ下剤ノ料ニ用キ、古魯聖篤實ト稱ス。種名ころしんちす(Colocynthis)ハ由緒アル古代ノ名ナリ。