


第2739圖



第2740圖



第2742圖

くらがりしだ
一名 きひも・おうじのひげ
Drymotaenium

Miyoshianum Makino.
(= *Taenitis Miyoshiana* Makino.)

中部地方ノ深山老樹ノ幹ニ着生シテ下垂スル多年生常綠羊齒草本。根莖ハ横走シ、莖面ニ隆起セル葉痕ヲ多數ニ遺セリ。葉ハ多數相接シテ配列シ單一ニシテ狹線形ヲ呈シ銳尖頭ヲ有シ末端鈍形ヲ成ス、質頗る厚クシテ毛ナク、長キ者40cm許アリ。葉脈ハ網眼狀ヲ成シテ葉肉中ニ沈在シ、囊堆ハ葉裏ニ膨起セル中脈ノ兩側ニ長ク縱列シ黃色ヲ呈シ苞膜ナシ。子葉ニハ長柄アリ。其外觀恰モしらん屬なかみしらんニ於ケルガ如シ、然レドモ其葉脈ハ兩者全然相異ナレリ。此 *Drymotaenium* 屬ハ曾テ予ノ新設シタル者ニシテ林ノ *Drymos* 級ノ *tainia* ノ兩語ヨリ成リ且中唯此くらがりしだ一種アルノミ。和名暗がりしだハ初木本種ノ發見採集セラレシ飛彈國益田郡落合村暗がりノ地名ニ由リテノ稱ナリ、木紐ハ樹上ニ在テ其紐狀葉ノ樹上ヨリ垂下セシ状ニ基キシ名、おうじの鬚ノおうじノ意ハ未詳ナリ。

まめづた (螺層草)
一名 まめごけ・いはまめ・かがみごけ
Drymoglossum microphyllum C. Chr.

(= *Lemmaphyllum microphyllum* Presl.)

諸州ノ巖面・石上或ハ樹幹等ニ着生スル多年生常綠羊齒草本ニシテ殊ニ暖地ニ多シ。根莖ハ長ク匍匐シテ絲狀フ成シ長キ者ハ時ニ1mニ及ビ、褐色又ハ暗褐色ノ細小ナル線狀鱗片ヲ生ジ且鬚根ヲ出セリ。葉ハ綠色ニシテ疎ニ根莖ニ出デ、裸葉即チ榮養葉ト胞子葉トノ別アリテ一株上ニ兩型葉ヲ具フ。裸葉ハ短柄ヲ有シテ根莖ノ兩側ニ排列シ其表面ヲ上ニシテ平在シ、圓形又ハ倒卵形ニシテ全邊ヲ成シ厚キ肉質ニシテ光澤ヲ有シ長サ1cm内外アリ。胞子葉ハ裸葉ニ混ジテ少數ニ生じ長サ2-4cm許アリ、線狀笠形ニシテ圓頭、下部ハ細長ナル柄ト成リ、上部ニ線形ノ囊堆二條ヲ具ヘ黃褐色又ハ褐色ヲ呈ス。葉脈ハ葉肉内ニ沈在シ網眼狀ヲ成ス。和名豆づた・豆苔・岩豆ノ名ハ皆其葉ノ小形ナルコト豆大ノ如ケレバ云ヒ、鏡苔ハ葉圓クシテ光リ宛モ昔ノ圓鏡ノ如ケレバ云フ、故ニ又鏡面草ノ漢名アリ。

ひとつば (石韋・飛刀劍)
古名 いはのかは・いはぐみ・いはがし
Cyclophorus lingua Desv.

(= *Aerostichum lingua* Thunb.; *Polypodium lingua* Sw.; *Niphobolus lingua* Spr.; *Polyicum lingua* Presl.)

諸州暖地ノ岩上等ニ着生シテ群ヲ成ス多年生常綠羊齒草本。根莖ハ粗大ナル針線狀ニシテ長ク匍匐シ、茶褐色又ハ赤褐色ノ披針形鱗片ヲ密布シ、處々ヨリ鬚根ヲ下シ、疎ニ葉ヲ出セリ。葉ハ單形ニシテ立チ葉面ノ長サ10-27cm、幅2-6cm許、葉柄ハ長クシテ通常10-26cm、アリ質硬ク針線狀ニシテ縱溝ヲ有シ星狀毛ヲ帶ビ根莖ヨリ出デテ鱗片ヲ密生セル短キ枝ト節合ス。葉面ハ廣披針形或ハ卵圓形披針形、銳頭、楔底、全邊ニシテ厚キ革質ヲ成シ邊緣往々多少ノ波狀ヲ呈ス、表面ハ深綠色ニシテ裏面ハ白褐色ノ星狀毛ヲ平布ス、中脈ハ葉面ニ隆起シ、支脈ハ羽狀ヲ成シテ斜上シ頗る規正ニ排ベリ。囊堆ハ點狀ニシテ多數密ニ接在シ裏面ノ大部又ハ全部ヲ被フ。時ニ葉ノ上部不齊ニ分裂スル變形品アリ、之レヲしひとつば (forma cristata Makino) ト云フ 和名一つ葉ハ其葉個々分立スルヲ以テ斯ク云フ。

いはおもだか
一名 ときはのおもだか
Cyclophorus hastatus C. Chr.
(= *Aerostichum hastatum* Thunb.;
Niphobolus hastatum Kunze;
Polyicum hastatum Presl.)

山中ノ岩上等ニ生ズル多年生常綠羊齒草本ニシテ叢出シ高サ15-20cm許アリ。根莖ハ短ク横走ラシテ下ニ鬚根ヲ出シ、黒色又ハ黒褐色ノ鱗片ハ長三密布シ、之レヨリ出ル葉ハ互ニ接近ス。葉面ハ10-20cm許ノ針線狀長葉柄ヲ有シ、葉面ニシテ裂又ハ五裂ノ鋸形ヲ呈シ、中央片最モ大ニシテ長サ7-10cm、幅2-3cmアリ、革質ニシテ厚ク、表面ハ淡綠色、裏面及ビ葉柄ニハ褐色粉狀表芒狀毛ヲ密生シ、葉裏ニハ粒狀ヲ成セル囊堆密布ス。中脈ハ葉裏ニ隆起シ、支脈ハ羽狀ヲ成シテ斜上シ相排ベリ。本品ハ其狀頗る趣キアリヲ以テ往々盆栽トシテ觀賞セラルコトアリ。和名岩おもだかハ岩上ニ生ジテ其葉おもだか葉ノ如シト謂ハレ此稱アリ。

びろうごした
一名 びろうどらん・みるらん
Cyclophorus linearifolius C. Chr.


(= *Niphobolus linearifolius* Hook.;
Polyodium linearifolium Hook.;
Neoniphopsis linearifolia Nakai.)

山中ニ生ジ樹上若クハ岩上ニ着生スル多年生常綠羊齒草本ニシテ往々群ヲ成スコトアリ。根莖ハ細長ニシテ横走匍匐シ、赤褐色ヲ呈セル鱗毛ヲ密生シ、下ニ鬚根ヲ發出セリ。葉ハ疎ニ小形ニシテ長サ6-10cm許アリ、無柄ヨリ出シ、小形ニシテ上部往々稍対称状ヲ呈シ下部ハ漸次ニ狭窄セリ、鈍頭ニシテ全邊ヲ成シ、淡綠色ニシテ上面ハ疎ニ下面ハ密ニ淡褐色・モビロウズノ如シ。囊堆ハ圓形ニシテ葉裏ニニ縦列ヲ成シテ排比其狀のきのぶニ于ケルガ如シ。葉脈ノ網眼ハ不齊ニ二列ヲ成シテ主ナル支脈ヲ見ズ。和名天鷲絨羊齒ハ其葉多毛ニシテ宛モビロウズノ觀アレバ云フ。


のきしのぶ (瓦韋・劍丹)
一名 いつまでぐさ・まつうらん・からすのわすれぐさ・やつめらん
古歌 しのぶ (同名アリ)

Polyodium Thunbergianum Makino
(= *Pleopeltis Thunbergiana* Kaulf.; *Lepisorus Thunbergianus* Ching; *Polyodium lineare* Thunb. non Burm. et Houtt.; *Pleopeltis linearis* Moore.)

極テ普通ニ樹皮上・岩面或ハ屋脊上等ニ見ル多年生常綠羊齒草本。根莖ハ稍粗大ニシテ横シ往々分枝シ、黒褐色又ハ暗褐色ノ鱗片ヲ密生シ下ニ鬚根ヲ有ス。葉ハ相接シテ根莖ヨリ出デ、相接近シテ叢生スルガ如シ、全邊ノ線狀ニシテ長サ10-30cm、幅5-10mm。銳尖頭ヲ有シ、底部ハ漸次狭窄シテ短柄ト成リ、革質ニシテ厚ク、表面ハ深綠色ニシテ小孔點散布シ、裏面ハ淡綠色ニシテ中脈ハ著シク隆起シ、支脈細脈ハ網眼狀ヲ成セドモ葉肉中ニ沈在シ見エズ。囊堆ハ葉裏ノ上半部ニ生ジ圓形ニシテ中脈ノ兩側ニ並列シ黄色ヲ呈ス。和名軒のぶハ此種往々屋根ノ端ニ生ズルヨリスケ云ヒ、何時迄草ハ綠色ヲ保チテ長ク生活スルヨリ云ヒ、松風蘭ハ松樹上ノふう蘭ノ意、鳥の忘れ草ハ鳥忘レ遺セシ草ノ意、又八ツ目蘭ハ葉裏ノ金星(囊堆)ハツアルノ意ニテ其多數ヲ表セシ者ナリ。



第2742圖



第2743圖

