


第 2751 圖



くりはらん (水石草)
一名 ほしひとつば・うらぼし
Polypodium ensatum Thunb.
(=Pleopeltis ensata Moore;
Microsorium ensatum H. Ito.)

山地樹下ノ陰地或ハ岩上等ニ生ズル多年生常緑羊齒草本ニシテ往々群ヲ成シテ繁茂セリ。根莖ハ太キ針線狀ヲ成シテ長ク横走シ、通常深緑色ニシテ淡褐色薄質ノ披針形鱗片ヲ密布ス。葉ハ極メ疎ニ出デテ長葉柄ヲ有シ、柄長凡20-30cm、硬質ニシテ前側ニ縦溝ヲ具フ。葉面ハ洋紙質ニシテ長サ20-40cm、幅5-6cm、長橢圓狀披針形ヲ呈シ、銳尖頭及ビ銳尖底ヲ有シ下部ハ漸次葉柄ニ沿下シ、葉縁ハ全邊ニシテ多少波狀ヲ成ス者アリ。中脈及ビ羽狀ヲ成セル支脈ハ著シク著明ナリ。葉柄及ビ葉裏面ニハ淡褐色ノ薄質鱗片ヲ散布ス。囊堆ハ圓形ニシテ裏面ニ散生スレドモ多クハ中脈ノ兩側ニ一列ヲ成シテ排ベリ。和名ハ栗葉蘭ノ意、即チ其葉狀ヲくりノ葉ニ比シテ斯克云ヒ、星一つ葉ハ葉裏ニ星狀ヲ成セル圓形囊堆アルヲ以テ云ヒ、裏星ハ同ジク葉裏ニ星狀囊堆ヲ着クル故云フ。


第 2752 圖



やのねしだ
Polypodium subhastatum Baker.
(=Microsorium subhastatum Ching;
P. Buergerianum Miq.)

暖地ノ樹陰ニ見ル多年生常緑羊齒草本ニシテ濕潤ノ地ニ生ジ岩上又ハ濕地ニ匍匐シ或ハ樹幹等ニ攀援ス。根莖ハ往々非常ニ長ク延ビテ暗色ノ針線狀ヲ成シ、淡褐色披針形ノ鱗片ヲ密布ス。葉ハ疎ニ根莖ヨリ出デ有柄ニシテ下方ノ者ハ其葉面截形底ノ鈍狀三角形、上方ノ者ハ漸次ニ長形ヲ呈シ遂ニ銳底ノ披針狀線形ト成リ一株上其形狀大小一様ナラズ、葉頭ハ鈍形・銳形又ハ銳尖形ヲ成ス、洋紙質ニシテ上面深緑色、裏面多少淡緑色ヲ呈シ、全邊又ハ波狀邊ヲ成シ、長サ4-20cm、幅1-4cmヲ算シ、葉柄ハ長サ1-5cm許アリ。囊堆ハ小形ニシテ多數アリ圓形ニシテ黄色ヲ呈シ葉ノ裏面ニ星布シ嫩キ時ハ之レヲ掩フニ稜角アル楕圓形ノ細鱗ヲ以テス。和名矢ノ根羊齒ハ其葉形ニ基テ云フ。


第 2753 圖



あをねかづら (水龍骨)
一名 びろうどしのぶ・いわしほね・さるの
しゃらが(同名アリ)・はひしゃらが
Polypodium niponicum Mett.
(=Marginaria niponica Nakai.)

暖地ノ岩上樹幹等ニ着生スル常緑ノ多年生羊齒草本ニシテ往々相密集シテ繁茂セリ。根莖ハ長ク横走シ青緑色ヲ呈セル多肉質ノ棒狀ニシテ屈曲分枝シ通常互ニ交錯シ、脱落シ易キ褐色ノ卵形鱗片ヲ帯ビ疎ニ根ヲ下セリ。葉ハ根莖ト關節ニシテ懸垂スルヲ常トシ、葉柄ハ葉全長ノ約三分ノ一ヲ占メ、褐色ノ光澤アル針線狀ニシテ硬シ。葉面ハ狭長ナル長橢圓形ニシテ長サ20-35cm許、銳尖頭ヲ有シ、下底ハ截形、單羽狀ニ深裂シ先端ハ其羽片漸次小ト成リ、質薄クシテ淡黄緑色ヲ呈シ、兩面ニ軟キ細毛ヲ密布シびろうどノ觸感アリ。羽片ハ多數ニシテ開出シ廣線狀ニシテ銳頭、獨特ノ網狀脈ヲ有シ、小ナル圓形ノ囊堆ハ網眼中ニ遊離シタル小脈ノ先端ニ生ジ羽片中脈ノ兩側ニ各一列ヲ成ス。子囊ハ長柄ヲ有ス。和名ハ青根蔓ノ意ニシテ其根莖青緑色ナルヲ以テ云ヒ、大鷲統シのぶハ其葉軟細毛ヲ布キ之レニ觸レバびろうどノ如ケレバ云ヒ、鱗骨ハ其羽狀ノ葉ヲいわしノ骨ニ擬セシ者、猿ノ生薑ハ其肥厚ノ根莖ヲ山一棲ム猿ノ食フ薑ニ比セシ者、又這ひ生薑ハ其匍匐セル多肉根莖ヲ薑ニ比セシ者ナリ。

第 2754 圖



おしゃぐじでんだ
一名 おしやぐじでんだ
Polypodium japonicum Makino.
(=P. vulgare L. var. japonicum
Franch. et Sav.; P. Fauriei Christ.)

諸州山地ノ岩上又ハ樹上ニ見ル多年生羊齒草本ニシテ冬季ハ其葉枯落ス。根莖ハ横走シ稍緑色ヲ呈シ、黄褐色卵形ノ鱗片ヲ密布シ、稍接近シテ葉ヲ出ス。葉ハ長サ10-20cm許アリ、葉柄ハ長サ2-4cm許アリテ褐色ノ光澤アル針線狀ヲ成ス。葉面ハ長橢圓狀披針形、單羽狀ニシテ先端ハ漸次狭小ト成リテ銳尖頭ヲ呈シ、底部ハ截形ヲ成セリ。羽片ハ狭キ線形ニシテ鈍頭ヲ有シ、邊縁ハ淺キ鋸鋸齒ヲ具ヘ、葉脈ハ羽狀ヲ成ス。囊堆ハ細小ナル圓形ニシテ羽片ノ裏面ニ二列シ其數多シ。葉乾燥スレバ表面ヲ内ニシテ圓ク卷キ込ム特性アリ、故ニ之レヲ乾腊標品ト成ス時ハ能ク渦卷狀ト成ル。和名ハ御社貢寺でんだノ意、此種始メ信州木曾ナル社貢寺ノ林中ニ採ル故ニ斯克名ク、でんだハ或ルしだノ名ナリ。


いはひとで

一名 いはしゃらが・せいりょうかづら・
にっくわしだ

Polypodium ellipticum Thunb.
(=Gymnogramme elliptica Baker;
Colysis elliptica Ching.)

暖地樹下ノ岩面等ニ生ズル多年生ノ常緑羊齒草本。根莖ハ横走シ粗大肉ニシテ疎ニ分枝シ、深緑色ニシテ黒褐色ノ鱗片ヲ密布ス。葉ハ稀疎ニ根莖ニ生ジ長葉柄アリテ立チ、根莖ト關節ス。葉柄ハ狭長ニシテ硬ク、狭翼アリテ鱗片ハ殆ド之レ無クシテ裸出シ緑色ナリ。葉面ハ外形卵圓ニシテ15-20cm長ヲ有シ、殆ド全裂程ニ疎ニ深裂シ、側羽片ハ三乃至五對、各片相距リテ間隙ヲ有シ長橢圓狀披針形全縁ニシテ長尾樣銳尖頭ヲ有シ底部多クハ稍狭窄シテ中軸ノ翼部ニ合流ス、滑澤ナル革狀洋紙質ニシテ深緑色ヲ呈シ、乾ケバ乃チ黒變ス。胞子葉ハ裸葉ヨリ高ク抽キ其羽片ハ稍狭シ。囊堆ハ線形ニシテ羽片中脈ト葉縁トノ間ニ斜ニ相排ビ黄色ヲ呈シテ苞膜無ク、胞子ニハ不規則ノ稜アリ。和名岩人手ハ此種岩上ニ生ジテ其葉人手ヲ撞ゲシ狀ノ如ケレバ云ヒ、岩薑ハ岩ニ生ゼル其肥厚根莖ヲしゃらがニ擬シテ斯克呼ビ、青龍蔓ハ其匍匐セル綠色多肉ノ根莖ヲ走龍ニ比シテ云ヒ、日光羊齒ハ野州日光ニ在ルヲ以テ云フ(此種果シテ同地ニ在ル乎否)。

第 2755 圖



こけしだ

一名 むかでしだ・ひめこしだ・やうらく
しだ・なんきんこしだ・おほくぼしだ
Polypodium trichomanoides Sw.
forma Okuboi Makino.
(=P. Okuboi Yatabe.)

中部以南ノ森林中樹幹面等ニ着生スル小形羊齒ニシテ長サ3-10cm、一見藤類ノ如シ。根莖ハ短小。葉ハ簇生シ且多ク下垂シ葉柄ハ短シ。葉面ハ線形、羽狀ニ深裂シ兩面ニ毛茸ヲ散生ス。裂片ハ長橢圓形ニシテ鈍頭ヲ成シ、櫛齒狀ニ齊列ス。囊堆ハ羽裂片ノ基部ニ一個ツツ脈上ニ生ジ、小球狀ニシテ苞膜ヲ有セズ、中脈ヲ挟ンデ二列ヲ成ス。此羊齒ハ初メ明治十年頃東京ノ博物館員小野職繁・田中房種・田代安定・中島仰山・織田信徳數氏ニ由テ紀州ニ發見採集セラレ乃チこけしだ等ノ名ヲ下セリ、大久保三郎氏ノ之ヲ箱根ニ採リシハ其レヨリ遙ニ後ノ年ナリ。和名羊齒ハ其草小ニシテ藤ニ類スルヨリ云ヒ、蜈蚣羊齒ハ其羽裂セル葉ノ形狀ヨリ云ヒ、姫小羊齒ハ其草ノ小ナルヨリ云ヒ、環珞羊齒ハ其草ノ生ゼル狀ヨリ云ヒ、南京小羊齒ハ其草ノ小ナルヨリ云フ、南京トハ小形ヲ意味スル時能ク使用ス、即チなんきんこざくらノ如キ是レナリ、大久保羊齒ハ此しだヲ相州箱根ニ採リシ東京大學理科大學植物學教室助教大久保三郎氏ヲ記念セシ名稱ナリ。

第 2756 圖

