


第 2775 圖




うらぼし科

第 2776 圖



うらぼし科

第 2777 圖



926

ひめうらじろ

一名 うらじろしだ
Cheilanthes argentea Kunze.
(=*Pteris argentea* Gmel.)

山足ノ石崖、城壁ニ煙ノ石垣間等ニ生ズル多年生ノ羊齒草本ニシテ向陽ノ場處ヲ好ミ冬月ハ其葉殆ンド枯死シ、或ハ捲縮シ辛ジテ僅ニ残レリ。根莖ハ短ク横斜シ、黒褐色披針形ノ鱗片ヲ密生シ、葉ヲ叢生シ高さ10-20cm許アリ。葉柄ハ細キ鐵線状ニシテ又折レ易ク硬クシテ紫褐色ヲ呈シ光澤アリ、葉面ハ質稍厚ク、表面ハ綠色ナレドモ裏面ハ白色又ハ黃白色ノ粉狀物ヲ密布シ、稍五角状ノ觀アル三角形ニシテ長幅共に5-6cm許、數對ノ羽状ニ分レ最下羽片ハ最モ大ニシテ斜三角形ヲ成シ更ニ羽状ニ深裂シ、裂片ハ線状長椭圓形ニシテ裸葉ハ邊緣ニ微鋸齒ヲ有シ、中軸ハ紫褐色ヲ帶ビテ美ナリ。囊堆ハ各裂片ノ邊緣ニ生ジテ連續シ葉緣ノ反卷シタル苞膜ヲ以テ擁セラル。和名ノ如名、姫裏白ハ葉狀小形ニシテ且葉裏白色ナレバ云ヒ、裏白羊齒ハ同ジク葉ノ裏面白ケレバ此ク云フ。

みやまうらじろ

Cheilanthes Brandtii Franch. et Sav.

我邦中部山足ノ半陰半陽地ニ生ズル多年生羊齒草本ニシテ冬月ハ葉枯ル。根莖ハ肥厚ニシテ舊葉柄ノ基部竝ニ鱗片ヲ有シ、葉ヲ叢生ス。葉ハ全長30-40cm許、葉柄ハ稍短ク鐵線状ニシテ紫褐色ヲ帶ビ滑澤ニシテ折レ易ク、下部ニ稍大形ノ黃褐色鱗片ヲ被ル。葉面ハ長卵形乃至披針形ヲ呈シ、薄ク且軟ナル草質ナリ、上面ハ綠色、裏面ハ灰白色ノ粉狀物ヲ平布シ、再羽状ニ分裂シ、羽片ハ六乃至八對アリ、下部ノ者ハ卵形或ハ長卵形ニシテ小柄ヲ有シ上部ノ者ハ長椭圓形ニシテ殆ンド無柄、小羽片ハ卵狀長椭圓形ニシテ圓頭、羽狀ニ淺裂或ハ深裂シ、裂片ハ椭圓形ヲ呈ス。囊堆ハ裂片ノ邊緣ニ生ジ葉緣ノ反卷シタル苞膜ニ擁セラル。和名ハ深山裏白ノ意ナリ。

いはがねぜんまい

Coniogramme fraxinea Diels.
(=*Diplazium fraxineum* Don.)

山中樹下ノ陰地等ニ生ズル大形ナル多年生羊齒草本ニシテ冬月尙其葉殘存ス。根莖ハ鉛筆大ニシテ長ク横走シ、綠色ニシテ黃褐色又ハ茶褐色ノ鱗片ヲ帶ブ。葉ハ稍疎ニ出デ、葉柄ハ長サ40-70cm、淡綠色且背側ニ暗紫色ヲ帶ビ質硬クシテ平滑ナリ。葉面ハ洋紙様草質ニシテ軟ク長卵形ヲ成シテ長サ50-70cm、幅30-40cm許アリ、七乃至八對ヲ成セル羽狀ニ分レ、下部ノ一乃至三對ハ更ニ再ビ羽狀ニ分ル。羽片ハ廣線狀長椭圓形、先端ハ急ニ尾狀ニ延長シ、底部ハ短柄ヲ成ス。邊緣ニ微細ナル鋸齒ヲ有ス。葉脈ハ叉狀ニ分レテ平行シ網眼狀ヲ成サズシテ分立ス。囊堆ハ葉脈ニ沿テ線状ヲ成シ苞膜ナク、初メ黃白色ナレドモ遂ニ黒色ト成ル。和名ハ岩が根ぜんまいノ意、本品ハ其狀頗ルいはがねさうニ類スルヨリ乃チ其種ト相似タル名ヲ曾テ予ノ下セナリ。

第 2778 圖



うらぼし科

いはがねさう (鳳了草)

一名 かなびきさう
Coniogramme japonica Diels.
(=*Hemionitis japonica* Thunb.;
Gymnogramma japonica Desv.;
Notogramme japonica Pres.)

山野ノ樹林下等ニ生ズル大形ノ多年生羊齒草本ニシテ冬月モ尙其葉殘存ス。根莖ハ長ク横走シ綠色ニシテ淡褐色ノ鱗片ヲ密生ス。葉ハ疎ニ根莖ヨリ出デテ長葉柄ヲ有シ、其柄長ヘ50-60cm許、淡綠色ニシテ背側ハ褐黑色ヲ帶ビ平滑ニシテ質硬シ。葉面ハ大ニシテ長サ40-50cm、幅30-35cm、長卵形ニシテ三乃至五對羽狀ニ分レ、下部ノ一乃至二對ハ更ニ羽狀ニ分裂ス、羽片ハ線状長椭圓形ニシテ銳尖頭、短柄、微鋸齒ヲ有ス、綠色ニシテ葉脈ハ株ニヨリ葉面ニ縦黃斑ヲ現ハス者アリ、之レヲふりいはがねさう (forma *flavo-maculata* Makino) ト云フ。葉ノ支脈ハ中軸ニ近ク網眼脈ヲ形成シ他ハ概不平行ナルモ時ニ尚網脈ヲ成コトアリ。囊堆ハ支脈ニ沿テ着キ殆ンド葉裏ノ全面ヲ掩ヒ黃色ニシテ苞膜ヲ有セズ。本種ハいはがねせんまいニ酷似スルモ主トシ葉質剛強、網眼脈ニ田テ其種ト區別スルヲ得ベシ。和名岩が根草ハ山中ニ在テ岩脚ノ地ニ生ズルヨリ云ヒ、金引草ハ蓋シ其草ノ強壯ナルヨリ云ヒシナラン。漢名蛇眼草 (誤用)

こもちしだ

一名 おにせんまい・ほうびした
Woodwardia orientalis Sm.
(=*W. radicans* Sw. var. *orientalis* Luerss.;
W. prolifera Hook. et Arn.)

暖地普通ノ多年生常綠ノ大形強壯ナル羊齒草本ニシテ陽地或ハ陰地ニ懸崖ニ着生ス。根莖ハ粗大ニシテ横走シ、上方ヨリ下方ニ向テ生長スル特性ヲ有シ褐色ノ鱗片ヲ被リ多年ヲ歷テ長キ者ハ長サ40cmニ達シ、其前端ノ葉ヲ有スル葉ヲ叢生下方ニ撲垂ス。葉面ハ其大ナル者ハ長サ2m以上ニ達シ外形ハ長三角形状長椭圓形ヲ成シ、厚キ革質ニシテ淺綠色ヲ呈シ嫩時ハ往々紅色ヲ帶ブ。葉柄ハ粗大ニシテ鉛筆大アリ淡綠色ニシテ硬ク前側ニ縫溝アリ、其基部ニ茶褐色ニシテ3-5cm長アル卵狀披針形ノ大形鱗片ヲ密布ス。葉面ハ再羽狀裂ヲ成シ、羽片ハ廣披針形銳尖頭ニシテ短柄ヲ有シ、更ニ羽狀ニ深裂シ、裂片ハ廣線形或ハ線形ニシテ銳頭、上部ニ銳鋸齒ヲ有ス。葉脈ハ中脈ニ接シテ粗ナル網眼、葉緣ニ近クノクニ從テ漸次小形ノ網眼シテ形成ス。囊堆ハ中脈ニ接シテ脈上ニ生ジ狹長椭圓形ニシテ内向セル堅キ穂状苞膜ヲ具フ。往々葉ノ表面ニ多數ノ無性芽ヲ生ズル殊態アリ、此芽ニ落チ時ニ能ク生育スルコトアレドモ大抵ハ落後枯盡スル運命ヲ裏ケタリ。和名子持羊齒ハ葉上ニ芽ヲ生ズル故云ヒ、鬼せんまいハ粗大ナル草状ニ基キシ稱、鳳尾羊齒ハ葉状ニ由リシ名ナリ。

おほかぐま (狗脊)
Woodwardia japonica Sw.


暖國ノ山地ニ生ズル大形ノ多年生常綠羊齒草本。根莖ハ粗大ニシテ短ク横斜シ褐色鱗片ニテ被ハル。葉ハ叢生シ、葉柄ハ硬クシテ淡黃綠色、下部ニ大形ノ褐色披針形鱗片ヲ密生ス。葉面ハ闊大ニシテ長サ30-50cm、卵形或ハ長椭圓形ヲ呈シ單羽狀ヲ成シ葉頭部ハ急ニ狹窄ス。羽片ハ十對内外、線狀披針形ニシテ銳尖頭、底部鈍形無柄、革質ニシテ稍硬ク、表面ハ綠色無毛、裏面ハ淡綠ニシテ脈上ニ鱗片アリ、羽狀尖裂ヲ成シ、裂片ハ卵狀椭圓形ナリ。細脈ハ邊緣ニ向テ斜ニ平行シ網眼脈ヲ作ルコト少シ。囊堆ハ裂片ノ左右ニ接シテ生ジ、内向セル穂状ノ褐色苞膜ヲ以テ包被セラル。此種ハ地上ニ生ジテこもちしだノ如ク斷崖ニ見ズ。和名ハ大かぐまニシテ大ハ大形ノ意、かぐまハ或ル羊齒ノ名ナリ。

第 2779 圖



うらぼし科

第 2780 圖



うらぼし科