

第274圖



へちま (絲瓜)

Luffa cylindrica Roem.

熱帯ノ原産ニシテ、廣ク培養セララルル一年生攀緣草本。莖ハ綠色ニシテ卷鬚ヲ有シ長ク延ブ。葉ハ有柄、互生シ、掌狀ニ分裂シ、裂片ハ尖レリ。夏秋ノ候、黄色ノ雌雄花ヲ同株ニ生ズ。雄花ハ總狀ヲ成シ、雌花ハ獨在ス。果實ハ長大ニシテ深綠色ヲ呈シ、ながへちまと稱スル一品ハ、長サ往々1m餘ニ至ル。嫩果ハ食用ニ供セラレ、乾果ノ網狀纖維ハ海綿ノ如ク種々ノ用途アリ。又莖ヲ裁チテ所謂へちま水ヲ採リ、主トシテ化粧料ニ供ス。本品信州ニテとうりト云フ、とハいろはノヘトちトノ中間ニ在ル故ヘち間ノ意ニテ其和名ヲ生ゼシト謂フ。

第275圖



つるれいし (苦瓜)

一名 にかうり

Momordica Charantia L.

舊世界熱帯地ノ原産ニテ、園圃ニ栽培スル一年生草本。蔓莖ハ細長ニシテ、卷鬚ヲ有シテ攀援ス。葉ハ有柄、互生シ、掌狀ニ分裂ス。夏秋ノ候黄花ヲ開キ、花梗ニ一緑苞アリ。同株ニ雄花・雌花ヲ生ジ、五裂セル合瓣花冠ヲ有ス。漿果ハ全面瘤狀突起ニ被ハレ、黄赤色ニ熟シテ開裂シ、紅肉ニ被ハレタル種子ヲ露ハス。果實ニ長短ノ別アリ、長キヲながれいしト云ヒ、嫩瓜ヲ食用トス。種子ヲ被ヘル紅肉ハ甜クシテ食スベク、果皮ノ味ハ苦シ、故ニなが瓜ノ一名アリ、和名ハ蔓荔枝ノ意ニテ荔枝ハ其瓜ヲ之レニ比セシナリ、支那ニモ錦荔枝ノ名アリ。

第276圖



みやまにかうり

Schizopepon bryoniaefolius Maxim.


本邦中部以北ノ深山ニ生ズル一年生蔓草。葉ハ長柄アリ、心臟狀卵形ヲ呈シ、五乃至七角、先端尖リ、底部ハ心臟形ニシテ彎入部ハ圓形、質薄クシテ表面ニ毛アリ。卷鬚ハ葉ト對生シ二岐シテ甚ダ長シ。夏日開花、兩性花ハ株上其花ノミヲ生ジ毎花葉腋ヨリ細梗ヲ以テ單立懸垂シ、花體極メテ小サク帶微黄白色。雌花ハ白色ニシテ株上雄花ノミヲ生ジ立チタル複總狀花序ヲ成シテ腋出ス。花冠ハ五裂シテ輻狀ヲ呈シ、裂片ハ卵狀披針形ナリ。雄蕊ハ三箇。花柱ハ三岐ス。漿果ハ長サ1cm内外、橢圓形ナレドモ多クハ稍至ミ後チ開裂シ内ニ三種子ヲ藏ス。此種普通ハ皆兩性花ノミヲ生ズル株ナレドモ偶ニ雄花ノミヲ生ズル株ニ逢着ス、而シテ始メテ此雄株ヲ發見セルハ松村任三氏ニシテ同氏ハ明治十二年之レヲ岩代國會津地方ニ採集セリ、而シテ之レヲ精研シテ世ニ發表セシハ予ニシテ時ニ明治三十九年(1906)ナリ。

すずめうり

Melothria japonica Maxim.

原野或ハ水邊等ニ生ズル一年生ノ蔓草。莖ハ細長ク、攀援シテ長ク延ブ。葉ハ有柄互生シ、卵圓形ニシテ質薄ク、柔クシテ毛ナシ。夏日雌雄ノ小形白花ヲ腋生ス。花冠五裂シ、雌花ハ花下ニ子房アリ。果實ハ絲狀梗ニテ下垂シ、球形ニシテ直径1cm許アリ、平滑ニシテ初メ綠色、後熟スレバ灰白色ヲ呈シ、漿質。中ニ平キ小種子アリ。漢名 馬駝兒(誤用)

第277圖



ごきづる (合子草)

Actinostemma lobatum Maxim. var. racemosum Makino.

水邊ニ生ズル一年生蔓草。莖ハ長サ2m許、卷鬚ヲ有シテ他物ニ攀緣ス。葉ハ有柄、互生シ、三角狀披針形ヲ成シテ先端尖リ、下部ハ稍三-五起ヲ呈ス。秋時多數ノ帶黄綠小花ヲ總狀ニ綴ル。萼片五、花瓣五アリ、共ニ細長ニシテ尖レリ。雌花ハ下位子房ヲ伴ヒ雄花穂ノ本ニ出デ、絲狀梗ヲ有ス。花後橢圓形ノ綠實ヲ下垂シ、熟スル時ハ果皮ノ上半蓋ノ如ク相離ル。中ニ大ナル黑色ノ二種子ヲ容レ、蓋ト共ニ落ツ。和名ハ合器蔓ノ意ニテ、其果實ノ狀ニ基ク。

第278圖



まつむしさう

一名 りんぼうぎく

Scabiosa japonica Miq.

山野ニ生ズル越年生草本。莖直立シ、高サ60-90cm内外、對生セル枝ヲ分ツ。葉ハ對生シテ羽狀ニ分裂ス。夏秋ノ候紫色ノ頭狀花ハ下ニ綠色總苞ヲ伴ヒテ、長梗ノ頂ニ着キ、其外圍ノ花ハ花冠五裂シ、大形唇狀ニシテ下唇片闊ク、内部ノ花ハ花冠稍整齊四裂シ、小形ナリ。毎花小總苞ニヨリ圍擁セラル。四雄蕊アリテ分立シ、雌蕊ハ一。子房ハ下位。漢名 山蘿蔔(誤用)

第279圖

