第2793圖



うらぼし科

ちゃせんしだ（鐵角鳳尾草）

Asplenium Trichomanes *L.*

我邦中部以南ノ山地ニ生ズル稍常綠多年生ノ小形羊齒草本。葉ハ小ナル根莖ヨリ簇生直上シ或ハ擺開シ、葉柄ハ葉面ヨリ短ク、黑褐色、瘦細ニシテ脆質、光澤アリ、舊キ葉柄ノ基部ハ叢生狀ニ永ク殘存ス。葉面ハ線狀披針形ニシテ長サ 15–25cm、單羽狀ヲ成シ、羽片ハ多少疎ニ生ジテ二十對內外アリ、極メテ短カキ小柄ヲ具ヘ斜卵形或ハ扇狀楕圓形ヲ呈シ、先端ハ鈍形、前緣ニハ細齒アリ底部ハ廣楔形、稍革質ヲ成シ、表面ハ濃綠色ナリ。囊堆ハ羽片ニ六乃至八、支脈上ノ大部分ヲ占メテ廣線形ヲ呈シ、苞膜ハ側向シテ開ク。和名茶筌羊齒ハ其叢生セル葉狀ヲ茶筌ニ擬セシ名ナリ。

第2794圖



うらぼし科

ほんぐうしだ

一名　ひめちゃせんしだ・ひめぬり
とらのを・かみがもしだ

Asplenium oligophlebium *Baker.*
（=A. Fauriei C. *Chr.*）

中部以南ノ林中ニ生ズル多年生常綠ノ小羊齒草本。根莖ハ直立シテ枯殘セル舊葉柄ノ基部ヲ着ケ、下ニ鬚根ヲ發出ス。葉ハ有柄ニシテ叢生シ、綠色ニシテ質薄弱ナリ。葉柄ハ細長ニシテ滑澤、黑褐色ニシテ脆弱。葉面ハ線狀披針形ニシテ20cm內外ノ長サアリ、單羽狀ニシテ直立スレドモ上部外方ニ彎曲下垂シテ地ニ着キ小苗ヲ生ズル殊性アリ、羽片ハ長楕圓形ヲ成シ、多數ニ中軸ノ兩側ニ平開シ互ニ少シク相距リテ着生シ底部ノ前方ニハ耳片アリテ全體深鋸齒ヲ有ス。囊堆ハ少數ニシテ羽片ノ支脈ニ著キ、楕圓形或ハ長楕圓形ニシテ熟スレバ褐色ヲ呈シ、苞膜アリ。和名本宮羊齒ハ初メ尾張國丹羽郡二ノ宮ノ本宮山ニ採リシヨリ此ク名ク、是レ即チほんぐうしだノ眞品ナリ、後年誤リテ、Lindsaya cultrata *Sw.* ヲ目シテほんぐうしだト呼ビシハ非ニシテ宜シク此品ノ名ヲ改訂スベキナリ、而シテ今之レヲにせほんぐうしだト呼ベルハ其當ヲ得タル者ナリ、又姫茶筌羊齒・姫塗り虎の尾ハ其草狀ニ基キシ稱、又上賀茂羊齒ハ京都ノ北地上賀茂ニ生ズルヲ以テ呼ビシナリ。

第2795圖



うらぼし科

おほたにわたり

一名たにわたり・みつながしは

Asplenium antiquum *Makino.*
（=Thamnopteris antiqua *Makino*;
Neottopteris antiqua *Masam.*）

我邦南方暖地ノ山林中ニ生ズル多年生常綠ノ大形羊齒草本ニシテ多クハ樹上・岩上等ニ着生シ、又觀賞品トシテ廣ク溫室等ニ培養セラルルヲ見ル。葉ハ單一ニシテ塊狀ヲ成セル粗大ノ根莖ヨリ多數叢生シ宛モ漏斗狀ヲ呈シテ四方ニ斜開シ、其大ナル者ハ徑凡ソ 2m ニ擴ガリ其狀頗ル壯大ナル者アリ。葉面ハ長楕圓狀披針形ヲ呈シ、葉柄ハ非常ニ短ク、底部及ビ先端ハ尖リ、全邊、革質ニシテ表面ハ綠色ヲ呈シ滑澤ナリ。中脈ハ其背面下方紫黑色ヲ帶ビ、支脈ハ中脈ヨリ開出シ多數ニシテ其左右ニ排ビ互ニ平行セリ。囊堆ハ狹長ニシテ殆ンド眞直、支脈ニ沿ヒ相接シテ多數平行シ、一端ハ中脈ニ接在シ他端ハ葉緣ニ近ク廣ク中脈竝ニ葉緣ノ間ヲ占メ、苞膜ハ線形ナリ。此種其新葉ハ車輻狀ヲ成シテ出ル殊態アリ。和名ハ大谷渡リ又谷渡リノ意ニシテ要スルニ溪谷邊其處此處ニ見ルヨリ斯ク云ヒシナラン、御綱がしはハ歷史ニ在ル古名ナリ。琉球名　山蘇花（誤用、是レしまおほたにわたりノ名ナリ）

第2796圖



うらぼし科

こたにわたり

Phyllitis scolopendrium *Newm.*
（=Asplenium scolopendrium *L.*;
Scolopendrium vulgare *Sm.*）

我邦中部ノ山地竝ニ北部寒冷ノ山地樹陰ニ生ズル多年生ノ常綠羊齒草本。根莖ハ短大ニシテ傾臥シ、下ニ鬚根ヲ發出ス。葉ハ單形ニシテ根莖ヨリ叢立シ、葉柄ハ長サ10–20cm 許、綠色ニシテ淡褐色披針形ノ鱗片ヲ密生ス。葉面ハ廣線形或ハ線狀披針形又ハ長楕圓狀線形ニシテ長サ20–25cm、幅4–6cm、綠色ニシテ薄キ革質ヲ呈シ、全邊ニシテ先端ハ鋭形ヲ成シ、底部ハ心臟形ニシテ且多少耳形ヲ呈ス。葉脈ハ多數ニシテ斜ニ開出シ分枝シテ平行ス。囊堆ハ多數アリ中脈ト葉緣トノ間ニ平行シテ排ビ葉裏ノ大部分ヲ占領シテ粗大ナル線狀ヲ成シ、熟スレバ褐色ヲ呈シ、苞膜ハ線形ニシテ二者近ク密接シ互ニ向キ合ヒテ開キ、宛モ一囊堆ヲ見ルノ觀アリ。和名小谷渡りハ之レヲ大谷渡りニ比スレバ遙ニ小形ナレバ云フ。

第2797圖



うらぼし科

くものすしだ

一名　ゑんこうらん

Camptosorus sibiricus *Rupr.*
（=Scolopendrium sibiricum *Hook.*;
Phyllitis sibirica *O. Kuntze.*）

山地ニ產シ或ハ陰地或ハ陽地ニ在テ多クハ石灰岩ノ罅隙ニ生ズル多年生ノ常綠小羊齒草本。葉ハ單葉ニシテ小形ノ根莖ヨリ叢生シ、長サ5–20cm、稍革質、綠色ニシテ光澤ナク、楕圓形・狹長卵形・披針形又ハ線形等ヲ成シ、底部ハ鋭形或ハ圓狀楔形等ヲ呈シ、全邊ヲ成シ、其長短一樣ナラズシテ細キ葉柄ヲ有シ、葉柄モ亦或ハ長ク或ハ短シ。葉面ノ先端ハ細ク絲狀ニ延長シ地ニ着キテ其處ニ根ヲ下シ幼苗ヲ生ズル殊性アリ。囊堆ハ葉裏ノ脈上ニ沿附シテ生ジ、線形又ハ楕圓形ニシテ大小アリ、中脈ノ兩側ニ對生シテ苞膜ヲ具フ。和名蜘蛛の巢羊齒ハ其葉四方ニ延ビテ葉端根ヲ下シ苗ヲ生ズル姿ヲ蜘蛛ノ網ヲ張リタル狀ニ擬シ乃チ此ノ稱アリ。猿猴蘭ハ其葉長ク伸ビ所謂ゑんこうノ手ノ如ケレバ云フ。

第2798圖

うらぼし科

しけしだ

一名　しけくさ・ねどしだ

Diplazium japonicum *Bedd.*
（=Asplenium japonicum *Thunb.*）

到ル處山野ニ見ル多年生ノ羊齒草本ニシテ稍濕潤ノ地ヲ好ミテ生ジ、冬ハ葉無シ。根莖ハ長ク地中ヲ橫走シ疎ニ分枝シ薄質ノ淡褐色鱗片ヲ着ケ、下ニ鬚根ヲ生ズ。葉ハ軟キ草質ニシテ根莖ヨリ疎生シ、長サ20–40cm位ニ達シ、卵狀披針形ヲ成ス。葉柄ハ全長ノ約半ヲ占メ、淡褐色ノ鱗片ヲ散布ス。葉面ハ單羽狀ニシテ上部ハ中軸ノ兩側ニ羽裂シ、先端ハ鋭尖頭ヲ成シ、羽片ハ長楕圓狀披針形或ハ披針形、鋭尖頭、截底又ハ心臟底ニシテ極メテ短キ小柄ヲ有ス、最下羽片ハ最大ニシテ上部ハ漸次小形ト成リ、下部ノ者ハ羽狀ニ深裂又ハ淺裂シ、裂片ハ楕圓形、鈍頭ニシテ細鋸齒ヲ有ス。各裂片ノ裏面ハ中脈ノ兩側ニ於テ三乃至五ノ囊堆ヲ着ケ、線狀長楕圓形ヲ成シ、半月狀ノ苞膜ヲ具フ。和名濕氣羊齒ハ濕リタル地ニ生ズル羊齒ノ意ナリ。又濕氣草モ同意ナリ。井戸羊齒ハ此種能ク井中石壁ノ間ニ生ズルヨリ云フ。