


第 2811 圖

うらぼし科




第 2812 圖

うらぼし科



第 2813 圖

うらぼし科



めしだ

一名 おほいぬわらび (同名アリ)
Athyrium melanolepis Makino.
 (= *Asplenium melanolepis* Franch. et Sav.;
Athyrium Filix-foemina Roth.)

高山又ハ寒地ノ山ニ生ズル多年生羊齒草本ニシテ冬ハ葉枯ル。根莖ハ地中ニ在リテ大ナル塊状ヲ成シ、下ニ根ヲ發出ス。葉ハ長キ葉柄ヲ有シテ叢生シ、相集テ漏斗状ヲ呈シ高サ 50-120cmニ達ス。葉柄ニハ暗褐色ノ大形長卵形ノ鱗片ヲ被ル。葉面ハ草質ニシテ軟ク、再羽状ヲ成シ、長椭圓形ヲ呈シ先端ハ漸次狹窄シテ尖リ下端モ稍小形ト成リ、羽片ハ長椭圓状披針形ニシテ長サ 10-15cm、銳尖頭ヲ有シ殆ンド無柄、小羽片ハ長椭圓形ニシテ尖リ、邊緣ハ細ク缺刻状ニ分裂シ、裂片ハ線形ニシテ尖リ細鋸齒ヲ有ス。囊堆ハ多數細小ニシテ葉裏ノ脈上ニ相並ビテ着キ鈎形又ハ馬蹄形ヲ呈シ、剪製線アル苞膜ヲ有ス。和名ハ雌羊齒ニシテ雄羊齒ニ對セル名ナリ、をしだハ其形質豪壯ナレドモめしだハ軟弱ナリ、大犬蕨ハ大ナルいぬわらびノ意ニシテやまいぬわらびニモ同稱アリ。

みやまめしだ

Athyrium Filix-foemina Roth.
 var. *nigropaleaceum* Makino.

我邦中部及北部ノ高山帶濕潤ノ處ニ生ズル多年生ノ大形羊齒草本ニシテ冬期ニハ葉ナシ。根莖ハ粗大短厚ニシテ直立シ下ニ鬚根ヲ發出シ、其頂ヨリ七乃至十葉ヲ簇生、上部斜開ス。新葉ノ開舒前ニハ葉柄・中軸共ニ漆黒色ニシテ且ツ皺曲セル鱗片ヲ被ルヲ以テ著シ。葉柄ハ東生シテ葉面ヨリ短ク長サ 10-20cm アリテ直立ス。葉面ハ長椭圓状披針形、銳尖頭ニシテ長サ 20-100cm ニ餘リ、再羽状ヲ成シ、草質ニシテ軟ナリ、羽片ハ狭披針形、有尾銳尖頭、小羽裂片ハ椭圓形銳頭、更ニ羽状ニ淺裂或ハ尖裂シ、銳鋸齒ヲ刻ム。囊堆ハ所謂いぬわらび型ニシテ鈎状ノ者ヲ交ヘ、長サ 1-2mm アリテ小裂片中脈ト邊縁トノ間ニ位置ヲ占メ細脈ニ沿シ、剪製線アル苞膜ヲ具フ。和名ハ深山雌羊齒ニシテ深山ニ生ズルめしだノ意ナリ。

みやましけしだ

一名 はくまうゐので
Athyrium acrostichoides Diels.
 (= *Asplenium acrostichoides* Sw.;
Asplenium thelypteroides Michx.;
Athyrium thelypteroides Desv.)

山中ノ陰濕地ニ生ズル多年生羊齒草本ニシテ冬月ハ葉枯ル。根莖ハ短厚ニシテ直立シ塊状ヲ成シテ下ニ鬚根ヲ發出ス。葉ハ有柄ニシテ一株ニ叢生シ、高サ 50cm 乃至 1m 餘アリテ漏斗状ヲ呈シ、軟キ草質ヲ成シ、裸葉胞子葉ノ別アリテ裸葉ハ短シ。葉柄ハ多少紫褐色ヲ呈シ白色又ハ淡褐色ノ鱗片ヲ被ル。葉面ハ羽状ニシテ長椭圓形或ハ披針形ヲ成シ、上部ハ銳尖頭ヲ成シ下部ハ漸次ニ狹窄シテ小形ト成ル、羽片ハ多數アリテ開出し無柄ニシテ披針形ヲ成シ銳尖頭ヲ有シ、羽状ニ深裂シ、其裂片ハ椭圓形ヲ呈シテ鈎頭又ハ圓頭ヲ有シ全邊ナリ。囊堆ハ多數ニシテ線形ヲ成シ小裂片中脈ノ兩側ニ數箇ズツ整列シ、下部ノ者多クハ兩者背接シ、半月形ノ苞膜ヲ具フ。和名ハ深山濕氣羊齒ノ意、白毛猪の手ハ其葉柄ノ鱗片白色ナレバ云フ、即チ白色毛アルの意ナリ。

えだうちほんぐうしだ

Lindsaya orbiculata Mett.
 (= *Adiantum orbiculatum* Lam.;
L. flabellulata Dry.)

暖地ノ林下ニ生ズル多年生ノ常綠小形羊齒草本。根莖ハ横走スレド短ク、密ニ鱗片ヲ被リ暗褐色ヲ呈シ質硬ク下ニ鬚根ヲ發出ス。葉ハ稍散生、直立シ、高サ 10-30cm、葉柄ハ瘦長ニシテ葉面ヨリ長ク、栗褐色ニシテ硬ク、鱗片ナシ。葉面ハ再長卵狀三角形、或ハ卵狀披針形、單羽狀乃至再羽狀ヲ成ス、羽片ハ中軸ヨリ開出し、小裂片ニシテ前緣ニ菱狀扇形或ハ稍鐘狀ヲ成シ、鈎頭ニシテハ疎齒ヲ有シ、質稍厚ク或ハ薄シ。囊堆ハ小脈頂片ノ前緣ニ沿テ一列ノ成シ線形ニシテ小脈頂ニ在リ、苞膜ハ横方ニ長クシテ前方ニ開ケリ。和名ハ枝打ち本宮羊齒ノ意、本種ハ其葉所謂ほんぐうしだニ比シテ分岐多キヲ以テ斯ク呼ビタルモノナレドモ真ノほんぐうしだトハ何等ノ關係アルコト無シ。

ふじしだ

*Monachosorum**Maximowiczii* Hayata.

(= *Nephrodium Maximowiczii* Baker; *Polyodium Maximowiczii* Baker; *Ptilopteris Maximowiczii* Hance; *Dryopteris Maximowiczii* O. Kuntze; *Monachosorella Maximowiczii* Hayata; *Aspidium sanctum* Maxim.)

通常深山ノ樹林地ニ生ズル多年生ノ常綠羊齒草本。根莖ハ大形ナラズシテ或ハ横斜シ或ハ直立シ、下ニ鬚根ヲ發出ス。葉ハ有柄ニシテ叢生シ、葉柄ハ瘦長ニシテ紫褐色ヲ帶ビ光澤アリ。葉面ハ單羽狀ニシテ軟キ草質ヲ呈シ淡綠色ニシテ光澤無ク、線狀披針形ニシテ長サ 20-35cm 許、幅 2-3cm、下部ハ多少狹窄シ、上部ハ漸次ニ狹窄シテ長ク延長シ遂ニ地ニ着キ其末端ニ新株ヲ發生スル殊態アリ、羽片ハ多數ニシテ能ク相排ビテ開出し無柄ニシテ三角狀長椭圓形ヲ成シ銳頭ヲ有シ、楔狀底ヲ成シ、底部ノ前方ニ上向セル耳片ヲ有シ、邊緣ニハ細鋸齒アリ。囊堆ハ小形ニシテ苞膜無ク黃色ニシテ羽狀脈ノ先端ニ近ク着生シ、羽片ノ裏面ニ在テ其邊緣ニ接シテ一列ヲ成ス。和名ハ富士羊齒ノ意ニシテ尾張國丹羽郡ノ尾張富士山ニ産スルヨリ云フ。

きしうしだ


Monachosorum nipponicum

Makino.

暖地ノ山中林下溪側ニ生ズル纖麗ノ多年生常綠羊齒草本。根莖ハ短クシテ能ク傾臥シ下ニ鬚根ヲ發出ス。葉ハ叢生シ、細キ葉柄ニハ赤褐色ノ細鱗片ヲ有ス。葉面ハ鮮綠色ヲ呈シ三角狀披針形ニシテ銳尖頭、長サ 20-30cm、二三回羽狀、羽片ハ殆ド無柄ニシテ斜上シテ開出し、狹披針形ニシテ銳尖頭ヲ有シ羽狀ヲ成シ、小羽片ハ卵狀披針形銳尖頭ニシテ邊緣缺刻様ニ尖裂シ、裂片ハ狹クシテ纖細ノ感アリ、おほふじしだニ近似シ、一見區別ナキガ如シト雖モ中軸ノ先端苗ヲ生ズルコトナク、小羽片ハ銳尖頭ナルヲ以テ別チ得ベシ。囊堆ハ小羽片ノ裂片ニ走脈ノ末端ニ小點狀ヲ成シテ生ジ、苞膜ヲ缺ク。和名紀州羊齒ハ其產地ナル紀州ニ基ヅキテノ稱ナリ。

第 2814 圖

うらぼし科



第 2815 圖

うらぼし科



第 2816 圖

うらぼし科

