

第 2823 圖

うらぼし科



第 2824 圖

うらぼし科



第 2825 圖

うらぼし科



942

いしかぐま

Microlepia strigosa Pres.
 (= *Trichomanes strigosum* Thunb.;
Davallia strigosa Kunze.)

暖地ノ溪側石間山足路側等ニ多ク生ズル大形ノ多年生常綠羊齒草本ニシテ、往々群ヲ成シテ繁茂セリ。根莖ハ粗大ニシテ有毛、往々地上ニ露ハレテ横走ス。葉ハ長柄ヲ有シ、柄ノ長サ 30-70cm ニ達シ、短毛アリ。葉面ハ長椭圓形或ハ長椭圓狀披針形ニシテ銳尖頭ヲ有シ葉柄ヨリ長ク、再羽片ニシテ稍革質、表面ハ光澤アリテ毛無シ。羽片ハ線狀披針形、尾狀銳尖頭、葉面ノ先端ニ至ルニ從ヒ順次短小ト成リ急ニ小形ト成ルコト無シ、小羽片ハ卵狀長椭圓形ニシテ銳頭、斜楔狀底ヲ成シ邊緣ニ鋸齒アリ。囊堆ハ小形ニシテ小羽片鋸齒ハ深入底ニ近ク位シ、支脈末端上ニ生ジ、苞膜ハ圓腎形ノ囊狀ヲ呈ス。和名石かぐまハ蓋シ本品能ク石間ニ生ズルヨリ斯ク云ヒシナラン、而シテ恐ラク其剛キ葉質ニ基キニハ非ザルベシ。

しのぶ

Davallia Mariesii Moore.

諸州ノ山中巖面又ハ老樹上ニ着生スル多年生ノ羊齒草本ニシテ冬月ハ葉無シ。根莖ハ長ク横走シテ疎ニ分枝シ、粗大ニシテ淡褐色又ハ暗褐色ノ鋸狀披針形鱗片ヲ密布シ、處々ヨリ疎ニ鬚根ヲ下ス。葉ハ疎ニ根莖ヨリ出デ、葉柄ハ瘦長ナル針線狀ニシテ長サ 5-10cm、質硬シ。葉面ハ長サ 10-30cm、幅 10-20cm ノ三角形乃至長キ五角形ニシテ數回羽狀ニ分裂ス。最下羽片ハ最大ニシテ稍三角形ヲ呈シ、他ハ長卵狀三角形ヲ成シ共ニ短柄ヲ有ス。最終裂片ハ線狀長椭圓形ヲ成シ全邊ニシテ銳頭ヲ有シ各一小脈ヲ容ル。夏日葉裏ニ在テ小脈ノ終端ニ長椭圓形壺形ノ苞膜ヲ有スル囊堆ヲ生ジ、熟スレバ長柄アル子囊其壺口ヨリ少シク超出シテ褐色ヲ呈セリ。此種ハ其根莖ノ状竜ニ葉ノ姿頗ル雅趣ニ富ムヲ以テ愛顧セラレ人家ニ栽ヤラレ觀賞ノ資ト爲シ、其根莖ヲ以テしのぶ玉ヲ作り吊りしのぶト爲ルコトハ衆ノ能ク知ル所ナリ。和名忍草ハ、此草土無クシテ生ズル故、堪ヘ忍ブノ義ニテ斯ク云フト謂ヘリ。漢名 海州骨碎補(蓋シ誤用)

きくしのぶ

Humata repens Diels.
 (= *Adiantum repens* L. fil.;
Davallia pedata Sm.;
H. pedata J. Sm.)

暖地ノ岩面等ニ著生スル多年生常綠ノ小形羊齒草本。根莖ハ長ク横走シテ葉ヲ散着シ、質硬クシテ赤褐色披針形ノ鱗片ヲ密布シ、下ニ鬚根ヲ發出セリ。葉柄ハ長サ 5-10cm、硬クシテ立チ、鱗片ヲ散生ス。葉面ハ葉柄ヨリ短ク、外形三角形、銳尖頭、稍心臟底、厚クシテ革質ヲ呈シ強剛、暗綠色ニシテ光澤アリ、羽狀ニ全裂シ、羽片ハ卵狀披針形、漸尖頭、底部ハ葉面ノ中軸ニ流連邊緣ニ鋸齒アリ、最下羽片ハ他ヨリ大ニシテ下部外側ハ羽狀深裂シ、裂片更ニ齒牙ヲ具フ。囊堆ハ葉片ノ邊緣ニ近ク着生シ、苞膜ハ稍硬ク、基點ニ於テ小脈ニ着ク。和名 菊忍ハ其葉菊葉ニ似タルしのぶノ意ナリ。


たました

Nephrolepis cordifolia Pres.
 (= *Polypodium cordifolium* L.; *Aspidium tuberosum* Bory; *N. tuberosa* Pres.)

我邦南部ノ暖地海岸ノ乾燥地ヲ好ム多年生ノ常綠羊齒草本ニシテ多數集リ葉茂シテ群落ヲ成スヲ常トス、又溫室等ニ培養セラレテ觀賞ノ品トス。地下莖ハ直立或ハ横斜シ多數ノ有柄葉ヲ叢生シ、下ニ栗殼色光澤アル針線狀ノ根ヲ多數ニ發出シ、根上ニ鱗片多キ帶褐色ノ球塊ヲ着ケテ水分ヲ貯藏シ直徑凡ソ 1-2cm 許アリ。葉柄ハ迴カニ葉面ヨリ短ク滑澤ニシテ下方ニ淡褐色ノ鱗片ヲ密生ス。葉ハ細長ニシテ廣卵狀ヲ成シ上部ハ漸次ニ狹窄シ下部モ亦狭ク、單羽狀ヲ成シ光澤アリテ直立シ或ハ撓垂ス、長サ 50-60cm 餘ニ及ビ中軸ニ褐色ニシテ光澤アリ、羽片ハ多數ニシテ相接シ正シク排列シテ中軸ト關節シ、長椭圓線形ニシテ鈍頭ヲ有シ底部ハ無柄ニシテ稍心臟形ヲ成シテ前方ニ小耳片有シ、邊緣ハ鋸齒ヲ具ヘ、下部ノ者ハ漸次ニ矩形ト成ル。囊堆ハ小形ニシテ羽片裏面ノ兩側ニ並列シ、腎臟形ヲ呈スル苞膜ヲ具フ。和名玉羊齒ハ其根ノ球塊ニ基キシ稱ナリ。


第 2826 圖

うらぼし科



第 2827 圖

うらぼし科




るので
Polystichum aculeatum Schott
var. *japonicum* Christ.

(= *Aspidium aculeatum* Sw. var. *japonicum* Franch. et Sav.; *P. japonicum* Nakai) 諸州ノ山地背陰ノ處ニ多ク生ズル大形ノ多年生常綠ノ羊齒草本。葉ハ葉柄ヲ有シ、地下ニ在テ大ナル塊狀ヲ成セル根莖ヨリ叢生シテ漏斗狀ヲ成シ、長サ 50-70cm 許アリ、葉面ハ長椭圓形ニシテ先端ハ漸次ニ狹窄シテ尖リ、再羽狀ヲ成シ、稍革質ニシテ強キ光澤ヲ有シ、中軸ハ葉柄ト共ニ淡褐色又ハ赤褐色ノ長卵形又ハ披針形鱗片ヲ密布シ、羽片ハ多數ニシテ開出シテ廣線形ニシテ銳尖頭ヲ成シ、極メテ短キ柄アリ、小羽片ハ長卵狀菱形ニシテ、末端毛狀ノ鋸齒ヲ有シ、ナカル頭、楔狀底、短小柄ヲ有シ、葉面ニハ微細ナル毛狀鱗片ヲ具フ。囊堆ハ細微ニシテ多クハ小毛羽片ノ上半部ニ生ジ、暗褐色ノ小圓形ヲ成シテ小羽片中脈ト邊緣トノ間ニ位シ、圓形ノ苞膜ヲ具フ。和名 猪の手ハ鱗片密布セル其拳曲葉ヲゐのじしノ手ニ擬シス云ヒシナリ。漢名毛蕨(誤用)

第 2828 圖

うらぼし科



つやなしるので
Polystichum aculeatum Schott
var. *ovato-paleaceum* Kodama.

(= *P. ovato-paleaceum* H. Ito.) 山中樹下ノ地ニ生ズル多年生ノ常綠羊齒草本ニシテゐのでニ類似シ、大ナル根莖ヨリ有柄葉ヲ漏斗狀ニ叢生シ、高サ 30-70cm ニ達ス。葉柄ハ中軸ト共ニ前面ニ縦溝ヲ有シ、大小ノ長卵形乃至披針形ノ淡褐色鱗片ヲ密生ス。葉面ハ卵狀長椭圓形ニシテ先端銳尖頭ヲ成シ、稍革質ノ草質ニシテ淡綠色ヲ呈シ、再羽狀ヲ成ス。各羽片ハ開出シテ互生シ、線形ニシテ銳尖頭ヲ有シ、殆んど無柄ナリ、小羽片ハ多數ニシテ相互著シ接近シ、多少菱形又ハ長卵形ヲ成シ、邊緣ニ針狀ノ鋸齒ヲ具ヘ、銳頭、楔狀底ニシテ極メテ短キ小柄ヲ有ス。囊堆ハ細微ニシテ小羽片ノ裏面ニ在テ中脈ト邊緣トノ間ニ列ヲ成シテ點在シ、暗褐色ヲ呈シ、圓形ノ苞膜ヲ具フ。和名ハ艶無猪の手ニシテ其葉光澤無ケレバ云フ。

943