


第 2835 圖

うらばし科



第 2836 圖

うらばし科



第 2837 圖

うらばし科



たかねしだ

Polystichum lachenense Bedd.

我邦ニ在テハ稀ニ高山ニ産スル多年生ノ高山性羊齒草本ニシテ冬月ハ其葉枯槁ス。根莖ハ横臥シ多數舊葉柄本ノ残存者ヲ密塞シテ大形ト成リ且鱗片多シ。葉ハ多數密接シテ根莖ヨリ出デ、高サ10-20cm。葉柄ハ葉面ヨリ短ク、細長ニシテ紫褐色ヲ呈シ、下部ニハ淡褐色披針形鱗片ヲ生ズ。葉面ハ單羽狀ニシテ幅1-2cm許アリ、綠色ニシテ質稍厚ク、羽片ハ十乃至十餘對ニシテ卵形或ハ長卵形、鋭頭、廣楔底ヲ有シ殆ド無柄ニシテ邊緣ニハ缺刻狀鋸齒ヲ有ス。囊堆ハ羽片ノ中脈ニ接近シテ二列ヲ成シ熱スレバ葉裏一面ヲ被ヒ、苞膜ハ圓形ニシテ邊緣齒裂ス。前年ノ舊中軸ニハ、往々其先端ニ前年葉ノ一部分ヲ殘ス殊性アリ。和名ハ高嶺羊齒ニシテ高山上ニ生ズルヨリ云フ。

りやうめんしだ

一名 こがねわらび・こがねしだ・ぜんまいしのぶ

Polystichum Standishii C. Chr.

(=Lastrea Standishii Moore; Rumohra Standishii Ching.; Aspidium laserpitiiifolium Mett.)

山野ノ陰地ニ群生スル大形ノ多年生常緑ノ羊齒草本。根莖ハ鉛筆大ニシテ横行ス。葉ハ大ニシテ根莖頭ヨリ出デ高サ60cm-1.5mニ達スル者アリ、表裏兩面鮮綠色ニシテ剛クシテ薄キ草質ヲ呈ス。葉柄ハ長クシテ強硬、前面ニ縦溝ヲ有シ、褐色又ハ黄褐色ノ披針形ニシテ脱落シ易キ鱗片ヲ被ル。葉面ハ三回羽狀ニシテ長卵狀圓形ヲ成シ鋭尖頭ヲ呈シ、小羽片、裂片、細分セラレテ頗ル繁密ナリ、羽片ハ長卵狀披針形或ハ線狀披針形、鋭尖頭、小羽片ハ卵狀披針形ニシテ尖リ、最終羽片ハ菱狀又ハ卵狀圓形ニシテ疎ニ鋸齒ヲ有ス。囊堆ハ葉面下部若クハ中部ニ密ニ生ジテ數多ク熱スレバ褐色ヲ呈シ、最終羽片ニ二列シ、苞膜ハ圓形ヲ成シテ灰白色ヲ呈ス。和名兩面羊齒ハ其葉ノ表裏殆ド同色ナレバ云ヒ、黄金蕨並ニ黄金羊齒ハ其葉ヲ讚美シテ名ケシ稱、ぜんまい忍モ亦草狀ヨリ來リシ名ナリ。

やぶそてつ (貫衆)

一名 きじのを・とらのを

Polystichum Fortunei Nakai.

(=Cyrtomium Fortunei J. Sm.; Aspidium falcatum Sw. var. Fortunei Baker.)

山足ノ地・山地ノ樹下或ハ溪側等ニ生ズル常緑ノ多年生羊齒草本。葉ハ有柄ニシテ大ナル根莖ヨリ漏斗狀ヲ成シテ叢生ス。葉柄ニハ其基部ニ於テハ大形、上部ニ至ルニ從テ小形ナル褐色又ハ栗褐色ノ鱗片ヲ密布シ、鱗片ハ長卵形又ハ披針形ニシテ厚ク、光澤アリ。葉面ハ廣披針形ニシテ上部狹窄シ鋭尖頭ト成リ、稍厚キ草質ナレドモ光澤ナシ、單羽狀ニシテ長サ30-90cm許アリ、羽片ハ多數ニシテ中軸ノ兩側ニ斜上シテ開出シ兩々略ボ對生シ、廣披針狀楔形ニシテ多少鎌形ニ彎曲シ、鋭尖頭、截底或ハ鈍底ニシテ短柄ヲ有ス、邊緣ニハ細鋸齒アリ、特殊ナル網狀脈ヲ有シ、其中ニ游離小脈ヲ含ミ、其小脈ニ圓形ノ囊堆ヲ着ケ、笠形ノ苞膜ヲ具ヘ、其葉裏一面ニ散布スルノ狀宛モ蟲卵ノ着キタルガ如シ。和名 藪蕨鐵ハ藪地ニ生ズルをてつノ意、雄ノ尾並ニ虎ノ尾ハ葉狀ニ基キシ稱ニシテ此兩名ハ舊來ノ稱呼ナリ。

おにやぶそてつ

一名 おにしだ・いそへご・うしごみしだ Polystichum falcatum Diels.

(=Polypodium falcatum L. fil.; Aspidium falcatum Sw.; Cyrtomium falcatum Presl.) 瀕海ノ地ニ多ク生ズル常緑ノ強壯ナル多年生羊齒草本。根莖ハ大ニシテ塊狀ヲ成ス。葉ハ有柄ニシテ根莖ヨリ叢生シ、壯大ニシテ長サ60cm-1m許アリ。葉柄ハ強クシテ下方ニ大ナル褐色ノ廣卵形鱗片ヲ密布シ上方ノ者ハ漸次ニ小形ト成レリ。葉面ハ長卵狀披針形ノ單羽狀ニシテ厚キ草質、強光澤ヲ有シ濃綠色ヲ呈ス。羽片ハ鎌狀廣披針形ニシテ鋭尖頭ヲ有シ、基部ハ圓形又ハ廣楔形ニシテ極メテ短キ柄ヲ有シ、邊緣ニハ小波狀ノ鋸齒ヲ有スルコト常ナリ、往々粗齒アル者アリ。葉脈ハ裏面ニ隆起シ、特殊ナル網狀ヲ成シテ網眼ノ中ニ游離シタル小脈ヲ有ス。囊堆ハ多數ニシテ游離小脈ニ生ジ圓形ノ苞膜ヲ有シ、葉裏ニ散在ス。和名 鬼藪蕨鐵ハ本種やぶそてつニ似テ強健ナレバ鬼ト謂ヘリ。鬼羊齒モ亦同義ナリ、磯ヘゴハ海邊ニ生ズル羊齒ノ意、牛込羊齒ハ往時東京牛込ノ名産ナリシ故斯ク云フ。

めやぶそてつ

一名 いはやぶそてつ

Polystichum caryotideum Diels.

(=Aspidium caryotideum Wall.; A. falcatum Sw. var. caryotideum Baker; Cyrtomium caryotideum Presl.)

山地石礫ノ間主トシテ石灰岩地帯ニ生ズル常緑ノ多年生羊齒草本。根莖ハ斜臥或ハ直立シテ剛シ。葉ハ叢生シテ數少ク、葉柄ハ瘦長ニシテ鱗片ヲ被リ、下部ノ者漸ク闊大ニシテ密ナリ。葉面ハ單羽狀ニシテ羽片ノ數寧ロ少シ、卵狀披針形、鋭尖頭ニシテ多少鎌身狀ノ態アリ、下部ハ前方ニ一箇ノ鋭頭耳片ヲ分ツ、羽片長サ凡10cm許アリテ縁ニ尖細鋸齒ヲ刻ム、頂生羽片ハ往々二列ス、葉質硬クシテ薄ク、淡綠色ニシテ葉脈ヲ透見スベシ、葉脈ハ多數ノ網眼狀ヲ呈シ、囊堆ハ圓形ニシテ多數葉裏ニ散在シ、苞膜ハ圓形ヲ成シテ薄弱ナルヲ以テ云ヒ、岩藪蕨鐵ハ岩石ノ處ニ生ズルヨリ云フ。

げじげじしだ

Dryopteris decursive-pinnata


O. Kuntze.

(=Polypodium decursive-pinnatum van Hall; Aspidium decursive-pinnatum Kunze.)

諸州普ク山足等ノ陰地又ハ石崖等ノ陽地ニ生ズル多年生ノ羊齒草本ニシテ冬月ハ其葉枯槁ス。根莖ハ短クシテ直立シ、下ニ根ヲ發出ス。葉ハ根莖ヨリ叢生シテ葉柄ヲ有シ、草質ニシテ軟ク、長サ30-50cm許ニ達シ、葉柄・中軸共ニ褐色又ハ黄褐色ノ線狀披針形ノ鱗片ヲ密生ス。葉面ハ披針形ニシテ上下兩端ハ漸次ニ狹窄シ、先端ハ鋭尖頭ト成リ單羽狀深裂ヲ成シ、羽裂片ハ鉞狀線形ヲ呈シテ尖リ、互生シテ開出シ、深裂或ハ淺裂シ、裂片ハ鈍頭、時ニ淺鋸齒ヲ有シ、羽裂片最下ノ兩耳狀裂片ハ中軸ニ於テ互ニ連結シ爲メニ之字狀ノ觀ヲ呈セリ。囊堆ハ葉裏ニ散在シテ小ナル點狀ヲ成シ、毛狀ノ苞膜ハ脫落性ヲ具フ。和名 蛇羊齒ハ其葉狀ニ基キテ云ヘリ。


第 2838 圖

うらばし科



第 2839 圖

うらばし科



第 2840 圖

うらばし科

