


第 2841 圖

うらばし科



おほぼしりま

Dryopteris oreopteris Maxon. var. quelpaertensis Makino. (=D. quelpaertensis Christ; D. oreopteris Maxon var. Fauriei Miyabe et Kudo; Nephrodium montanum Baker var. Fauriei Christ.) 高山地帯ノ陰地陽地ニ生ズル多年生羊齒草本ニシテ冬季ニハ葉無シ。根莖ハ塊状ヲ成シテ短ク直立シ或ハ斜傾ス。葉ハ叢生シ、高サ50cm-1m許、草質ニシテ軟ナリ。葉柄ハ短クシテ葉ノ中軸ト共ニ淡茶褐色ノ卷縮セル鱗片ヲ密生ス。葉面ハ長橢圓狀披針形、上端ハ短ク鋭尖シ、下部ハ漸次ニ狹窄ス。羽片ハ略ボ直角ニ開出シ、線狀披針形、鋭尖頭、無柄、羽狀深裂ヲ成シ、下部ノ者ハ漸次小形ニ遞變シ三角形乃至耳形ト成リ、裂片ハ卵狀長三角形、鈍頭、殆ド全邊ナリ。囊堆ハ小點狀ニシテ裂片邊緣ノ近クニ並ンデ二列シ、苞膜ハ腎臟形ヲ呈ス。和名 大葉しりまハ草狀ひめした即チしりま (實ハ誤稱)ニ比シテ大ナレバ云フ。

第 2842 圖

うらばし科



はしごした

Dryopteris glanduligera Christ. (=Aspidium glanduligerum Kunze; D. gracilescens O. Kuntze var. glanduligera Makino; A. angustifrons Miq.)

乾燥セル山地ニ生ズル多年生常綠羊齒草本。根莖ハ長ク横行シテ硬ク稍疎ニ有柄葉ヲ出ス。葉ハ高サ30-60cm許アリ、濁綠色ニシテ質薄ケレドモ稍剛シ。葉柄ハ通常葉面ヨリ長ク、瘦細ナル針線狀ヲ成シテ硬ク、細微ナル毛ヲ有シ下部ニ小ナル褐色鱗片ヲ散生ス。葉面ハ披針形、上部ハ漸次狹窄シテ尖リ、單羽狀ヲ成ス、羽片ハ各疎隔シテ開出シ狭長橢圓形、鋭尖頭ニシテ殆ド無柄、裏面ニ細毛及ビ腺毛ヲ生ジ、羽狀深裂ヲ成シ、裂片ハ長橢圓形ニシテ鈍頭ヲ有ス。囊堆ハ小形ニシテ裂片ノ邊緣ニ近ク並列シ、毛茸ヲ有スル苞膜ヲ具フ。和名 梯子羊齒ハ其開出セル羽片宛モ梯子狀ヲ成セバ此ク云フ。

第 2843 圖

うらばし科



はりがねわらび

Dryopteris japonica C. Chr. (=Nephrodium japonicum Baker.)

山地ノ樹下或ハ山原等ニ生ズル多年生ノ羊齒草本ニシテ冬ハ葉無シ。根莖ハ細クシテ長ク横行シ、稍接近シテ葉ヲ出シ、葉長30-90cm許、長キ葉柄ヲ有ス。葉柄ハ針線狀ニシテ赤褐色又ハ紫褐色又時ニ淡綠色ヲ呈シ光澤ヲ有シ、下部ニ小ナル長卵形褐色ノ鱗片ヲ散生ス。葉面ハ立チテ質薄ク長卵狀橢圓形ニシテ單羽狀ヲ成シ、羽片ハ開出シ、下部ノ者大ニシテ多少下向シ、無柄ニシテ線狀披針形ヲ成シ鋭尖頭ヲ有シ、羽狀深裂ヲ成セリ、小羽裂片ハ線狀長橢圓形、鈍頭ニシテ正シク相並ビ、互ニ接近ス。囊堆ハ小羽裂片ニ二列ヲ成シテ多數相並ビ、内方ニ一缺アリ且ツ毛ヲ生ゼン圓形ノ苞膜ヲ有シ、灰色ニシテ頗ル分明ナリ。和名針金蕨ハ其長キ葉柄ノ狀ニ基キテ稱ナリ。

ひめわらび

Dryopteris oligophlebia C. Chr. (=Nephrodium oligophlebium Baker; Aspidium oligophlebium Christ.)

到ル處普ク山野ニ生ズル多年生ノ羊齒草本ニシテ冬月ハ其葉枯ル。大形ニシテ高サ80cmヨリ1.5m位ニ達シ、根莖ハ短ク横臥シ、接近シテ葉ヲ出ス。葉柄ハ粗大ニシテ長ク淡綠色ニシテ平滑、光澤アリ、基部ニ少數ノ褐色鱗片ヲ被ル。葉面ハ軟キ草質ニシテ淡綠色ヲ呈シ、滿面ニ細毛ヲ布キ、三角狀長卵形、鋭尖頭ヲ有シ、三回羽狀ニ分裂ス。羽片ハ數箇アリ、長橢圓狀披針形ニシテ長ク尖リ下部ノ者ハ短柄ヲ有シ上部ノ者ハ無柄ナリ、小羽片ハ多數ニシテ相接シ、線狀披針形鋭尖頭ヲ成シ、基部ハ羽片ノ中軸ニ流合シ、羽狀深裂乃至尖裂シ、裂片ハ橢圓形、鈍頭、鋸齒アリ。囊堆ハ細小ナル點狀ニシテ葉裏ニ滿布シ、裂片ノ邊緣ニ近ク並ビ、苞膜ハ腎形ヲ成シテ細毛アリ。和名 姬蕨ハ其葉細裂シ且薄弱ナルヨリ云フ。

いはひめわらび

Dryopteris punctata C. Chr. (=Polypodium punctatum Thunb.; Hypolepis punctata Mett.)

中部以南ノ山地或ハ山足地等ニ生ズル多年生ノ羊齒草本ニシテ冬ハ葉無シ。根莖ハ横走シ硬クシテ絨毛ヲ被ル。葉ハ根莖ニ散着シテ直立シ、兩面有毛ニシテ草質ナリ。葉柄ハ30cm内外ニシテ長ク質硬クシテ毛ヲ被フリ淡綠色ナリ。葉面ハ斜傾シテ開展シ廣橢圓形ニシテ上部狹窄シ、長サ30-50cm、再羽狀或ハ三羽狀ヲ成シ、羽片ハ披針狀橢圓形或ハ稍三角狀ヲ呈シ、小羽片ハ相接シ斜上シテ並ビ、橢圓狀披針形ヲ成シ、羽狀ニ全裂或ハ深裂シ、裂片ハ長橢圓形、稍鈍頭ニシテ更ニ羽狀ニ尖裂シ、或ハ往々單ニ鈍齒縁ヲ成スニ止マル。囊堆ハ裂片ノ中脈ト邊緣トノ中間ニ位シ、細小ナル圓形點狀ヲ成シ、黄色ヲ呈シ、苞膜無シ。和名ハ岩姫蕨ノ意ナレドモ本品ハ敢テ岩上ニ在ラズシテ地上ニ生ゼリ。

やはらした

Dryopteris laxa C. Chr. (=Aspidium laxum Franch. et Sav.)

諸國ノ山地樹下ニ生ズル菲弱ナル多年生ノ羊齒草本ニシテ冬ハ葉枯ル。根莖ハ大ナラズシテ淺ク地中ヲ横行シ葉ヲ散着シ其葉狀略ボはりがねわらびニ類似ス。葉柄ハ立チ、瘦細ニシテ質稍軟弱、無毛淡綠色ナレドモ下部ハ褐色ヲ帶ブ。葉面ハ葉柄ヨリ僅ニ長ク、外形ハ卵狀橢圓形ヲ成シ軟薄質ニシテ鮮綠色ヲ呈シ、單羽狀ヲ成ス、羽片ハ兩面軟毛ヲ布キ、各相隔リテ中軸ノ兩側ニ開出シ下部ノ羽片ハ長橢圓狀披針形ニシテ長尾狀鋭尖頭ヲ有シ、長サ5-15cm許アリテ羽狀深裂ヲ成シ、小羽裂片ハ長橢圓形ニシテ鈍頭ヲ有ス。囊堆ハ小羽裂片ノ中脈ト葉縁トノ間ニ二列ヲ成シ、苞膜ハ圓腎形ニシテ其邊緣ニ長毛ヲ生ズ。和名ハ柔羊齒ノ意ニシテ、其菲弱ナル葉ニ基キテ斯ク云フ。

第 2844 圖

うらばし科



第 2845 圖

うらばし科



第 2846 圖

うらばし科

