


第 2847 圖

うらばし科




ほしだ
Dryopteris acuminata Nakai.
(=*Polypodium acuminatum* Houtt.;
P. sophoroides Thunb.;
Aspidium sophoroides Sw.;
D. sophoroides O. Kuntze.)

暖地ノ山野隨處ニ普通ニ生ジテ陽地或ハ半陽地
ヲ好ム多年生常緑ノ羊齒草本。根莖ハ長ク横走
シテ稍粗大硬質、疎ニ有柄葉ヲ出ス。葉ハ長サ
50-70cmニシテ薄キ革質ヲ成シテ剛シ。葉柄ハ
瘦細ニシテ長ク、褐色披針形ノ小鱗片ヲ散生ス。
葉面ハ單羽狀複葉ヲ成シ、長橢圓形ニシテ上部
ハ急ニ狹窄シテ穗様ヲ成シ一羽片ノ觀アリ、羽
片ハ多數アリ線狀ニシテ鋭尖頭ヲ成シ、基部ハ
短柄ヲ有シ、羽狀ニ淺裂又ハ尖裂シ、裂片ハ線狀
橢圓形ニシテ稍鋭頭ヲ成シ、羽片ノ基部ニシテ
上向セル第一次ノ裂片ハ特ニ長ク伸長シ、多少
中軸ヲ掩フ傾向アリ。囊堆ハ小羽裂片ノ邊緣ニ
近ク位置シ初メ黄色ナレドモ熟スレバ黒褐色ト
成リ、苞膜ハ圓腎形ナリ。和名穂羊齒ハ其葉先
特ニ伸ビテ穗様ヲ呈スルヲ以テテスク云ヘリ。

第 2848 圖

うらばし科




ひめしだ 一名 しよりま
Dryopteris thelypteris A. Gray.
(=*Acrostichum thelypteris* L.; *Aspidium*
thelypteris Sw.; *Thelypteris palustris* Schott.)

中部北部日本ニ多ク南日本ニ稀レナル多年生羊齒草
本ニシテ好シク原野濕潤ノ地ニ生ジテ群ヲ成シ、冬月
ハ其葉枯稿ス。根莖ハ長ク地中横走シ下ニ鬚根ヲ發
出ス。葉ハ疎ニ根莖ヨリ生ジテ直立シ高サ50-70cmニ
達シ、葉柄ハ針線狀ニシテ平滑ナリ。葉ニハ裸葉、胞
子葉ノ別アリテ一株ニ出デ、裸葉ニ在テハ高サ稍低ク
且多少其葉幅闊シ。葉面ハ長橢圓形、兩端短ク尖リ、
淡綠色或ハ黄綠色ノ草質ニシテ質薄ク且軟ナリ、單羽
狀ヲ成シ、羽片ハ無柄ニシテ開出シ線狀長橢圓形、鋭
頭ヲ有シ、羽狀ニ深裂或ハ尖裂シテ小裂片ヲ成シ、小
裂片ハ廣卵狀ヲ呈シ鈍頭ニシテ全邊或ハ細鋸齒ヲ有
ス。葉脈ハ分生シ小脈ハ又狀ヲ成ス。囊堆ハ小形ニシ
テ邊緣ト中脈トノ中間ニ並ビ、熟スレバ葉裏面ヲ被覆
シ、葉縁ハ多少裏面ニ卷ク傾向アリ。和名姫羊齒ハ其
薄弱小形ナル草狀ニ基キテ云ヒ、しよりまハあいぬ語
そるまノ轉化セル者ナレドモ、元來此そるまハくそ
てつニ對スルあいぬノ土言ナレバ之レヲひめしだニ
用ウルハ非ナリ。

第 2849 圖

うらばし科



いたちしだ 一名 しのはちでんだ
Dryopteris varia O. Kuntze.
(=*Polypodium varium* L.; *Aspidium varium*
Sw.; *Polystichum varium* Presl.)

諸州到ル處ノ山足等ニ普通ニ生ズル多年生常緑ノ羊
齒草本。短ク横走シテ塊狀ヲ成シタル根莖ヨリ接近シ
テ葉ヲ出ダシ、葉柄ハ質硬クシテ中軸及ビ羽片中軸ト
共ニ紫褐色ノ鱗片ヲ密布シ、葉柄ノ基部ハ特ニ肥厚シ
内肉綠色ナリ。葉面ハ長サ30-70cm許、革質ニシテ濃
綠色ヲ呈シ殆ト光澤無ク、長卵形又ハ長橢圓形、再羽
狀ニ分裂シ、羽片ハ長橢圓狀披針形、鋭尖頭ニシテ短
柄ヲ有シ、最下羽片ハ最大ニシテ更ニ其外側第一次ノ
小羽片ハ特ニ甚ダシク大ナリ、小羽片ハ線狀披針形、
鋭頭又ハ稍鈍頭、底部ハ楔形又ハ心臟形ニシテ極メテ
短キ小柄ヲ有シ、羽狀ニ深裂又ハ淺裂シ、最終裂片ハ
圓頭ヲ成ス。囊堆ハ小羽片ノ中軸ニ近ク二列ヲ成シ、
灰白色圓形ノ苞膜ヲ有ス。和名馳羊齒ハ蓋シ此羊齒體
上ニ暗色ノ鱗毛多ケレバテスク云フナラン、しのはちで
んだノでんだハ或ル羊齒ノ名ナレドモしのはちハ不
明ナリ。漢名 綿馬(誤用)

しらねわらび

Dryopteris dilatata A. Gray.
(=*Polypodium dilatatum* Hoffm.;
Aspidium dilatatum Sw.;
A. spinulosum Sw. var. *dilatatum* Hook.)

高山深山ノ樹林下等ニ群生スル多年生羊齒草本
ニシテ冬月ハ葉無シ。根莖ハ大ナル塊狀ヲ成ス。
葉ハ有柄ニシテ叢生シ、草質ニシテ長サ60cm-
1mニ達ス。葉柄ハ廣卵狀ノ淡褐色又ハ茶褐色
鱗片及ビ線狀披針形鱗片ヲ被ル。葉面ハ長卵狀
五角形又ハ長卵狀橢圓形ニシテ先端急ニ狹窄シ
テ尖リ、三回羽狀ニ分裂シ、羽片ハ少數ニシテ開
出シ卵狀披針形ニシテ鋭尖頭ヲ有シ極メテ短ク
有柄或ハ殆ト無柄、最下ノ一對ハ大ニシテ三角
狀卵形ヲ成シ、外側最下ノ小羽片ハ他ヨリ大ナ
リ、小羽片ハ長橢圓狀披針形、鋭頭、最終裂片ハ
卵形ニシテ鋭鋸齒ヲ有ス。囊堆ハ細小ニシテ葉
ノ裏面ニ散布シ、小羽片ノ中脈ニ接近シテ竝ビ、
苞膜ハ圓腎形ナリ。和名白根蕨ハ蓋シ初メ野州
日光ノ白根山ニ採テ名ケシ者ナラン。

第 2850 圖

うらばし科



べにしだ

一名 やよひわらび
Dryopteris erythrosora O. Kuntze.
(=*Aspidium erythrosorum* Eaton.)

隨處ニ最モ普通ナル多年生常緑羊齒草本。葉ハ斜上
セル根莖ヨリ叢生シ、大ナル者ハ1mニ達スルコトア
リ。葉柄ハ長クシテ硬ク、黒褐色又ハ濃褐色ノ披針形
鱗片ヲ有シ、其基部ノ者殊ニ大ニシテ密ナリ。葉面ハ
卵形又ハ長橢圓狀長卵形ニシテ再羽狀ヲ成シ、葉質剛
クシテ洋紙狀革質ヲ成シ深綠色ニシテ稍光澤ヲ帶ビ
幼時ハ紫赤色ヲ呈ス。羽片ハ披針形、鋭尖頭ヲ成シ短
キ柄ヲ有シ、上部ノ者ハ漸次小形ト成ル、小羽片ハ線
形ニシテ基部ハ廣楔形、下部ノ大ナル者ハ極メテ短キ
小柄ヲ有スレドモ其大部分ノ者ハ羽片中軸ニ沿附シ、
鋭頭或ハ稍鈍頭ニシテ鋸齒若クハ缺刻アリ。羽片中軸
及ビ小羽片中軸ノ鱗片ハ囊狀ヲ成ス。囊堆ハ圓形ニシ
テ小羽片ニ二列シ、圓腎形ノ苞膜ハ其嫩時多クハ美ナ
ル紅色ヲ呈ス。和名紅羊齒ハ其嫩葉紅色ニシテ美ナル
ヨリ云ヒ、彌生蕨ハ春時萌出スル美ナル新葉ヲ賞讃シ
テ名ケシ者ナリ。

第 2851 圖

うらばし科



第 2852 圖

うらばし科

ちりめんしだ

Dryopteris erythrosora O. Kuntze
var. *prolifera* Makino.
(=*Aspidium prolificum* Maxim.;
Lastrea prolifera Moore;
Nephrodium prolificum Diels.)

通常盆栽トシテ園藝家ノ愛植スル所ニシ
テ疑モ無クべにしだノ一變種ナリ。母種
ト同ジク常緑ノ羊齒ニシテ全草母種ノ如
ク大ナラズ、小形ニシテ長サ凡30cm許ニ
達シ、深綠色ヲ呈シ葉質剛シ。べにしだ
ト同様再羽狀ヲ成シ、羽片ハ疎ニシテ披
針形或ハ線形ヲ成シ、上部漸次ニ狹窄シ
テ鋭ク尖リ、小羽片ハ狭クシテ尖リ、不
齊ニ皺縮シテ頗ル珍形ヲ呈シ、通常其面
上ニ小苗ヲ發生スル性アリ。小羽片ノ裏
面ニ二列セル囊堆ヲ見ル。和名縮細羊齒
ハ其皺曲セル葉ニ基キシ稱ナリ。