

第 2853 圖

うらばし科




ほそばのいたちしだ
Dryopteris subtripinnata

O. Kuntze.

(=Aspidium subtripinnatum Miq.; Nephrodium chinense Baker.; D. chinensis Koidz.)
山野ノ陰地或ハ陽地ニ生ズル多年生羊齒草本ニシテ冬月ハ葉無シ。根莖ハ短クシテ横臥・斜傾或ハ直立シ、叢生セル葉ヲ出ス。葉柄ハ細長ニシテ15-20cm許、基部ニ暗褐色或ハ茶褐色ノ長卵狀披針形鱗片ヲ被リ、上部ハ葉ノ中軸ト同ジク殆ド無毛ナリ。葉ハ三回羽狀ニシテ廣卵狀五角形ヲ呈シ、長サ15-25cm許アリ、羽片ハ長卵形、鋭尖頭ニシテ短柄ヲ有シ、最下羽片ハ最モ大ニシテ廣卵狀菱形ヲ成シ、最終羽片ハ卵狀長橢圓形鋭頭ニシテ鋭鋸齒ヲ有ス。囊堆ハ多クハ葉面ノ上半部ニ着キ、最終裂片ノ邊緣ニ近ク並列シ、圓腎形ノ苞膜ヲ有ス。和名ハ細葉ノ融羊齒ノ意ナリ。

第 2854 圖

うらばし科



まるばべにしだ

Dryopteris obtusissima Makino.

(=Nephrodium erythrosorum Hook. var. obtusum Makino; D. erythrosora O. Kuntze var. obtusa Makino; D. Makinoi Koidz.)

西南暖地ノ林下ニ生ズル常緑ノ羊齒。根莖ハ短大ニシテ斜立シ、頂ヨリ數葉ヲ出シテ斜傾出シ其狀頗ルべにしだニ似タリ。葉柄ハ褐色ノ鱗片多シ。葉面ハ葉柄ヨリ長ク、革質ニシテ光澤ニ富ミ、卵狀長橢圓形ニシテ再羽狀ヲ成シ、羽片ハ極メテ短キ柄ヲ有シテ開出シ披針形ニシテ鋭尖頭ヲ有シ、小羽片ハ卵狀長橢圓形ニシテ其下部ハ往々急ニ擴ガリ、全縁ニシテ鈍頭或ハ圓頭ナリ。囊堆ハ稍大ニシテ殆ソド小羽片ノ中脈ニ接シテ着生シ、而カモ羽片ヲ通ジテ其中軸ニ近ク配列セル者多ク、赤褐色ノ圓點ヲ成シ、苞膜ハ圓腎形、胞子ニハ不規則ノ粒點ヲ布ク。和名圓葉紅羊齒ハべにしだニ似テ其小羽片ノ頭端特ニ圓ケレバスク云フ。

第 2855 圖

うらばし科



みやまべにしだ

Dryopteris monticola C. Chr.

(=Nephrodium monticola Makino.)

深山樹下ノ地ニ生ズル多年生ノ羊齒草本ニシテ冬月ハ葉無シ。根莖ハ短大ニシテ地下ニ横臥シ、葉ヲ叢生ス。葉ハ大形ニシテ高サ60cm乃至1mニ達シ、洋紙狀草質ヲ成ス。葉柄基部ニハ廣大ナル長卵狀ノ栗褐色鱗片ヲ密生シ其上部及ビ葉面ノ中軸ニモ亦淡褐色披針形鱗片ヲ被ル。葉面ハ再羽狀ヲ成シ、長橢圓形、先端ハ急ニ狹窄シテ尖リ、羽片ハ廣線狀ニシテ鋭尖頭ヲ成シ、短柄ヲ有シ、小羽片ハ線狀長橢圓形、鈍頭ニシテ微鋸齒アリ。囊堆ハ小羽片中脈ノ兩側ニ二列シ圓形ノ苞膜ヲ有ス。和名ハ深山紅羊齒ノ意ニシテ其葉狀べにしだニ髣髴セバスク云フ。

とうごくしだ

一名 ひろはべにしだ

Dryopteris cystolepidota C. Chr.

(=Aspidium cystolepidotum Miq.; A. erythrosorum Eat. var. cystolepidotum Maxim.)

暖國ノ山地ニ生ズル多年生常緑ノ羊齒草本。根莖ハ粗大ニシテ短ク傾上ス。葉ハ有柄粗大ニシテ叢生シ、長サ50cm-1m許ニ達シ、深緑色ニシテ光澤少ク、薄キ革質ヲ成シテ剛シ。葉柄ハ長クシテ質硬ク、下部ニ黒褐色披針形ノ鱗片ヲ有ス。葉面ハ長卵狀橢圓形ニシテ先端ハ急ニ狹窄シテ尖リ、二回羽狀ヲ成シ、中軸ニハ囊狀鱗片ヲ密布シ、羽片ハ斜上シ長橢圓狀披針形、鋭尖頭ニシテ短柄アリ、小羽片ハ卵狀披針形又ハ長橢圓狀披針形ニシテ鋭頭ヲ有シ、羽狀尖裂ヲ成ス。囊堆ハ小形ニシテ多クハ葉面上中部ノ小羽片中脈ニ近ク密ニ竝ビ、苞膜ハ圓腎形ヲ成ス。本種ハ其葉狀葉質べにしだニ類セリ。和名ハ東谷羊齒ノ意ニシテ尾張ノ東谷山ニ生ズレバスク云フ、廣葉紅羊齒ノ和名ハ舊ク予ノ此羊齒ニ命ゼシ者ナリ。

くまわらび

Dryopteris lacera O. Kuntze.

(=Polypodium lacerum Thunb.; Aspidium lacerum Sw.)

山地ノ樹下ニ多ク半常緑ノ多年生羊齒草本。根莖ハ大ナル塊狀ヲ成シテ葉ヲ叢生シ赤黄褐色ノ鱗片多シ。葉柄ハ短クシテ葉面ノ中軸ト共ニ茶褐色又ハ赤黄褐色ノ光澤アル長卵形又ハ披針形鱗片ヲ密生ス。葉ハ長サ40-50cm許アリ、表面ハ鮮黄緑色ニシテ且特ニ細脈ノ凹溝線多ク、裏面ハ稍白色ヲ帶ブ。葉面ハ卵狀長橢圓形ニシテ二回羽狀ヲ成シ、羽片ハ長卵狀橢圓形ニシテ先端ハ漸次ニ尖リ、基部ニハ短キ柄ヲ有シ、小羽片ハ多少三稜狀ナル長橢圓形ニシテ鋭頭、細鋸齒アリ、基部ハ中軸ニ融着シ、下部ノ者ハ底部多少耳形ヲ呈ス。囊堆ハ葉ノ上部三分一若クハ四分一許ノ裏面ニ生ジ、其部ノ羽片竝ニ小羽片ハ著シク縮小シ、各堆ハ各小羽片ニ二列ニ生ジ、圓腎形ノ苞膜ヲ具ヘ、熱スレバ殆ソド小羽片全部ヲ掩フテ褐色ヲ呈シ、此部ハ冬季ニ於テ他部ヲ殘シ乾枯ス。和名熊蕨ハ其株上ニ見ル多數密集ノ鱗片ヲ熊ノ多毛ニ擬シ此稱アリ。

なぐまわらび

Dryopteris uniformis Makino.

(=Nephrodium lacerum Baker var. uniforme Makino.)

山野ノ陰地或ハ陽地共ニ多ク生ズル普通ノ常緑多年生羊齒草本。根莖ハ短大ニシテ少數ノ有柄葉ヲ叢生ス。葉柄ハ葉面ヨリ長ク短ク通常黒褐色或ハ時ニ黄褐色ノ鱗片ヲ有シ殊ニ其基部ニ密生ス。葉面ハ長橢圓狀披針形、長サ30-60cm、鋭尖頭、單羽狀或ハ下半ハ再羽狀ヲ成シ、羽片ハ線狀長橢圓形ニシテ尾狀ニ鋭尖シ羽狀ニ深裂シ、裂片ハ長橢圓形、上部ニ微齒アリ、革質ニシテ淡緑色ヲ呈シ、平滑ニシテくまわらびノ如クニ葉脈陥入スルコト無シ。囊堆ハ全葉上半部ノ全裏面ニ著生シ、小羽裂片中脈ノ兩側ニ在テ支脈ノ中途ニ一箇ツツヲ着ケ二列ヲ成シ、圓腎形ノ苞膜ヲ有ス。本種ハくまわらびニ類シト雖モ、其葉概シテ狭長、其鱗片大抵暗色ヲ呈シ、葉面ノ細溝著シカラズ、又其囊堆アル葉部通常廣範圍ニ互リ且冬季ニ凋萎セザル諸點ヲ以テ容易ニ其種ト識別シ得ベシ。和名ハ熊蕨ノ意ニシテ其草狀くまわらびヨリ强健ナルヲ以テスク云フ。

第 2856 圖

うらばし科



第 2857 圖

うらばし科



第 2858 圖

うらばし科

