


第 2859 圖

うらばし科



をしだ

一名 めんま (此稱非ナリ)

Dryopteris crassirhizoma Nakai.

(=Lastrea Filix-mas A. Gray non Presl; Aspidium Filix-mas Miq. non Sw.)

稍寒地ノ山中ニ生ジ林下ノ地ニ見ル大形ノ多年生羊齒草本ニシテ冬月ハ其葉枯稿ス。根莖ハ直立シ巨大ナル塊状ヲ成シテ葉ヲ輪狀ニ叢生ス。葉ハ有柄大形ニシテ高サ1-1.4m許、質稍厚シ。葉柄ハ粗大ニシテ強剛、下部ニハ褐色披針形ノ大形鱗片ヲ密生シ、上部ハ葉ノ中軸ニ於ケルガ如ク小形ノ褐色又ハ黄褐色或ハ汚褐色ノ條裂セル鱗片ヲ密布ス。葉面ハ再羽裂ヲ成シ、倒披針形ニシテ尖リ、羽片ハ多數ニシテ開出シ長橢圓狀披針形、銳頭ニシテ無柄、下部ノ者ハ漸次小形ト成リ、羽狀ニ深裂シ通常殆ド中脈ニ達シ、小羽裂片ハ線狀長橢圓形、鈍頭、鋸齒ヲ有ス。囊堆ハ羽裂片ノ中脈ニ沿ヒ二列ヲ成シテ二乃至數對ニ並ビ、苞膜ハ圓腎形ナリ。根莖ヲ綿馬根ト稱シ驅蟲劑トス。和名雄羊齒ハ雄壯ナル羊齒ノ意ニシテ雌羊齒ニ對シテ明治年間以來稱シ名ナリ。往時クまわらびト呼ビシハ或ハ此レ乎、世是人漢名ノ繇馬ニ基キ從來之レヲめんまつ呼ベドモ是レ最モ非ナレバ本羊齒ニ對スル此稱ハ當ニ斷然廢スベキモノナリ。漢名 繇馬 (誤用、繇馬ハ此ノ如キ羊齒ニ非ズ)

第 2860 圖

うらばし科



みやまくまわらび


Dryopteris polylepis C. Chr.

(=Aspidium polylepis Franch. et Sav.)

深山樹林下ノ地ニ生ズル多年生羊齒草本ニシテ冬ハ葉枯ル。根莖ハ大ナル塊状ヲ成シ、葉ヲ叢出シ漏斗狀ニ輪生シ、宛モをしだノ如キ姿態ヲ呈ス。葉柄ハ短ク葉ノ中軸ト共ニ黒褐色ノ披針形鱗片ヲ密生ス。葉ハ全長50-80cm許ニ達シ薄キ革質ヲ呈シ深綠色ナリ。葉面ハ長橢圓形ニシテ先端漸次ニ尖リ、基部モ亦次第ニ狹窄シ、羽片ハ線狀長橢圓形、銳尖頭ニシテ殆ド無柄、深ク羽狀ニ細裂シ、裂片ハ接在シ、長橢圓狀線形ニシテ多少鎌狀ヲ呈シ、銳頭、微鋸齒ヲ有ス。囊堆ハ上部ノ小羽裂片ノミニ生ジ、各片ニ二列シ、圓腎形ノ苞膜ヲ有ス。和名ハ深山熊蕨ノ意ナリ。

第 2861 圖

うらばし科



みやまいたちしだ

Dryopteris Sabaei C. Chr.

(=Aspidium Sabaei Franch. et Sav.)

深山樹陰ノ地ニ生ズル半常緑ノ多年生羊齒草本。根莖ハ短ク横臥シ接近シテ有柄葉ヲ出ス。葉柄ハ長サ15-30cm、下部ハ多少紫褐色ヲ帶ビ、褐色又ハ栗褐色ノ廣卵形大形鱗片ヲ着ク。葉面ハ薄キ革質ニシテ鮮綠色ヲ呈シ、表面ニ細脈ノ溝痕ヲ存シ、長サ20-40cm、卵形ニシテ疎ナル再羽狀ヲ成シ、羽片間ノ間隔ハ大ナリ。羽片ハ長卵形ニシテ銳尖頭ヲ有シ、就中最下ノ羽片最モ大ニシテ廣卵形ヲ呈シ、小羽片ハ長卵狀披針形、銳頭ヲ成シ、無柄ニシテ多クハ中軸ニ融着ス。囊堆ハ葉面ノ上部裏面ニ生ジ、小羽裂片ノ中脈ニ接シ二列ヲ成シテ數箇着キ、大形ナル圓腎形ノ苞膜ヲ有ス。和名ハ深山雌羊齒ニシテ深山ニ生ズルいたちしだノ意ナリ。

第 2862 圖

うらばし科



みやまわらび

Dryopteris phegopteris C. Chr.

(=Polypodium phegopteris L.; Phegopteris polypodioides Fée; Ph. vulgaris Mett.)

各地ノ深山樹陰ニ普通ニ生ズル多年生ノ羊齒草本ニシテ冬月ハ葉枯ル。根莖ハ瘦長ニシテ横行シ淡褐色ノ鱗片ヲ被リ疎ニ葉ヲ出ス。葉柄ハ瘦長ニシテ長サ10-25cm許アリ、多少葉面ヨリ長キヲ常トシ、下部ニハ淡褐色披針形ノ鱗片ヲ被ル。葉面ハ薄キ革質ニシテ上面ニ細毛ヲ疎布シ下面ハ毛更ニ多ク且鱗片ヲ混生シ、長サ10-20cm、卵狀三角形ヲ成シ、先端銳尖頭ヲ呈シ、單羽狀ヲ成ス。羽片ハ披針形ニシテ長ク尖リ、多數ニ羽深裂或ハ羽尖裂シ、多數ナラズシテ中軸ノ兩側ニ開出シ、大抵對生シ、下部ノ者ハ稍下向シ、上部ノ者ハ其基部中軸ニ融着ス。裂片ハ長橢圓形、鈍頭、全邊ニシテ、基部ノ裂片ハ廣ク中軸ニ沿附融合シテ特狀ヲ呈セリ。囊堆ハ羽片裂片ノ邊緣ニ近ク並び、黄色ニシテ橢圓形ヲ成シ、苞膜ヲ缺如シ、子囊ニハ往々其囊部ニ一ニ突起アリ。和名ハ深山蕨ノ意ニシテ此種深山ニ生ズレバ云フ。

第 2863 圖

うらばし科



みぞしだ

Dryopteris africana C. Chr.

(=Polypodium africanum Desv.; P. tottum Willd. non Thunb.; Gymnogramma totta Schlecht.; Leptogramma totta J. Sm.)

山野到ル處或ハ濕潤地或ハ不濕地等ニ多ク生ズル多年生ノ羊齒草本ニシテ冬ハ葉枯ル。根莖ハ地中ヲ横行シ、葉ハ有柄ニシテ稍接近シテ根莖ヨリ出デ、高サ30-70cm許、淡綠色ニシテ軟キ革質ヲ成シ、軟毛ヲ密布シ、葉柄ハ細長ニシテ長橢圓形ノ黄褐色鱗片ヲ散生ス。葉面ハ卵狀長橢圓形ヲ成シテ尖リ、單羽狀ヲ成ス。羽片ハ相接シテ開出シ、長橢圓狀披針形、銳尖頭ニシテ無柄、上部ノ者ハ漸次小形ト成リ、下部ノ者ハ微シク反向シ、羽狀ニ深裂或ハ尖裂シ、裂片ハ橢圓形、鈍頭、殆ド全邊ナリ。囊堆ハ最終裂片ノ中脈ノ兩側ニ斜メニ並びテ二列ト成リ其支脈上ニ沿テ長短ノ線形ヲ成シ、初メ黄色ナレドモ熟スレバ黑色ト成リ、苞膜ヲ有セズ。和名 溝羊齒ハ多ク溝側ニ生ズレバ云フ。

第 2864 圖

うらばし科



ならるしだ

Dryopteris Miqueliana C. Chr.

(=Aspidium Miquelianum Maxim.; Nephrodium Miquelianum Yabe; Rumohra Miqueliana Ching.)

深山樹下ノ地ニ生ズル多年生ノ羊齒草本、冬月ニハ葉枯ル。根莖ハ長ク地中ヲ横走シ疎ニ葉ヲ出ス。葉柄ハ長サ15-25cm、瘦細ニシテ前面ニ縱溝ヲ印シ、多少紫褐色ヲ帶ビ、淡褐色ノ卵狀乃至披針形鱗片ヲ被ル。葉ハ長柄ヲ有シ薄質ニシテ軟弱、淡綠色ヲ呈シ淡褐色鱗片及ビ細毛ヲ被フル。葉面ハ長サ25-40cm、幅20-35cm、廣卵狀五角形ヲ呈シ、三或ハ四回羽狀ヲ成シ裂片繁多ナリ。羽片ハ長卵形、銳尖頭ニシテ柄アリ。最下羽片最大ニシテ廣卵狀菱形ヲ成ス。小羽片ハ多數、卵形、最終羽裂片ハ鈍頭ノ橢圓形ニシテ鋸齒或ハ缺刻ヲ有ス。囊堆ハ細小ナル點狀ニシテ葉ノ裏面ニ散點シ、苞膜ハ圓腎形ヲ成ス。和名 奈良井羊齒ハ明治十三年 本羊齒ヲ始メテ信州西筑摩郡奈良井ニ採リ斯ク名ケシ者ナリ。