

第 2871 圖

うらばし科



えびらした  
一名 ぢくをれした  
*Dryopteris oyamensis* C. Chr.  
(= *Polypodium oyamense* Baker; *Currantia oyamensis* Copel.; *P. Krameri* Franch. et Sav.; *Phegopteris Krameri* Makino.)

山地稀ニ見ル多年生羊齒草本ニシテ地ニ生ジ、冬ハ葉無シ。根莖ハ極メテ長ク横走シ細長ニシテ疎ニ分枝シ稀疎ニ葉ヲ生ズ。葉柄ハ根莖ヨリ立ち、瘦細ナル針線狀ニシテ光澤ヲ有シ、長サ20-25cmアリ、下部ニ白褐色ノ膜質鱗片ヲ有ス。葉面ハ膜狀洋紙質ニシテ毛ナク、菲弱ニシテ鮮綠色ヲ呈シ、基部ハ角度ヲ以テ葉柄ト節合シ奇狀ヲ呈シ、長卵狀三角形ニシテ羽狀ニ深裂シ、裂片ハ狭長ナル長橢圓形ニシテ鈍頭ヲ有シ、下部ノ者ハ羽狀ニ浅裂シ浅裂片ハ圓頭ヲ成シ、上部ノ者ハ鈍鈍齒ヲ具フ。葉脈ハ分生シテ著シク分明ナリ。囊堆ハ橢圓形並ニ圓形ニシテ大小一様ナラズ、細脈ニ沿着シテ葉裏ニ散生シ、苞膜ヲ缺如ス。孢子葉ハ橢圓形ニシテ小突起アリ。和名ハ蓋シ筋羊齒ノ意ニシテ其葉形弓ノ筋ヲ挿ス筋ニ似ルトシテ其名ヲ呼ビシ者乎、軸折れ羊齒ハ其葉柄ノ中軸ニ連ナル處關節アリテ多少角度ヲ成シ曲折セルヨリ云フ。

第 2872 圖

うらばし科




かうやわらび  
一名 ぜんまいわらび  
*Onoclea sensibilis* L.

原野或ハ山原ノ濕潤地ノ草中ニ生ズル多年生ノ羊齒草本ニシテ冬月ハ其葉枯死ス。根莖ハ細長ニシテ地中ニ横行シ下ニ根ヲ發出ス。葉ハ根莖ヨリ疎出シテ立ち、裸葉ト孢子葉ト別アリ。裸葉ハ高サ30-60cm許、薄キ草質ニシテ無毛ナリ。葉柄ハ瘦長ニシテ硬ク、葉面ヨリ長クシテ長サ20-40cm許、下部ニ極メテ少數ノ淡褐色卵形鱗片ヲ被ル。葉面ハ圓形又ハ橢圓狀卵形ニシテ羽狀深裂ヲ成シ或ハ下部ハ羽狀ヲ呈シ、中脈ノ兩側ニハ下部ヲ除キ翼ヲ成シ、上部ハ急ニ狭窄シテノ頂片ヲ有ス、羽片ハ數對アリテ狭長ナル長橢圓形或ハ披針形ヲ成シ、鈍頭ヲ有シ、羽狀ニ尖裂シ或ハ波狀鈍齒ヲ有ス。葉脈ハ網狀ヲ成ス。孢子葉ハ裸葉ト同株ニ生ジテ長柄ヲ有シ、羽狀ヲ成シ、羽片ハ裂片ハ縮形シテ球狀ヲ呈シ、其内部ニ囊堆ヲ有ス。和名高野蕨ハ紀州高野山ニ生ズルヨリ云ヒ、ぜんまい蕨ハ其葉多少ぜんまいノ狀アレバ云フ。

第 2873 圖

うらばし科




くさそてつ  
一名 にはそてつ・がんそく・こごみ・こごめ  
*Matteuccia Struthiopteris* Todaro.  
(= *Osmunda Struthiopteris* L.; *Onoclea Struthiopteris* Hoffm.; *Struthiopteris germanica* Willd.)

群ヲ成シテ山野ノ林中ニ生ズル多年生羊齒草本ニシテ冬月ハ其葉枯稿ス。根莖ハ塊狀ヲ成シテ直立シ、特ニ地下枝ヲ出シテ長ク地中ニ横走シ、其先端ニ新根莖ヲ生ジ、下ニ根ヲ發出シ上ニ葉ヲ出シ、裸葉孢子葉ノ別アリテ一株ニ出デ、裸葉先ツ現ハレ、孢子葉ハ秋ニ至テ出ヅ。裸葉ハ車輪狀ヲ成シテ叢生シテ大形ニシテ高サ40cmヨリ1m以上ニ達シ、草質ニシテ綠色ヲ呈シ毛無ク、下ニ短キ葉柄ヲ有シ、柄本ニ鱗片アリ。葉面ハ倒披針形ヲ成シ、先端ハ急窄シ、羽片ハ多數相接シテ中軸ヨリ開出シ、線形ニシテ鋭尖頭ヲ有シ、無柄ナリ、下方ノ者ハ漸次ニ小形ヲ成シ透ニ小耳狀ト成リ、羽狀ニ深裂シ、裂片ハ長橢圓形、鈍頭ヲ成シ殆ド全邊、底部後方最下ノ一裂片ハ特ニ長ク鈍ビテ鎌狀ヲ呈シ葉ノ中軸ヲ被フ殊態アリ。孢子葉ハ裸葉ノ中心ヨリ出デテ裸葉ヨリ低ク、羽狀ニ分裂シ、羽片ハ狭長ニシテ多數相接シ其縮形セル裂片ハ囊堆ヲ包メリ。本種ノ特別ナル根莖ヲ引テ新苗ヲ生ズルヲ以テ其繁殖極メテ旺盛ナリ。其嫩葉ヲ食用トス。和名草蘇鐵ハ草狀ヲ呈セルそてつノ意、庭蘇鐵ハ庭ニ生ズルそてつノ意、雁足ハ其葉柄ヲ雁ノ脚ニ擬セシ名、こごみ・こごめハ其屈曲シテ卷ケル嫩葉ニ基キシ稱ナリ。

第 2874 圖

うらばし科



いぬがんそく  
一名 おほかぐま・へびがんそく・いぬくさそてつ・おほくさそてつ・いつまでぐさ  
*Matteuccia orientalis* Trev.  
(= *Struthiopteris orientalis* Hook.; *Onoclea orientalis* Hook.; *Pentarhizidium japonicum* Hayata.)

山地樹下ノ地ニ生ズル多年生ノ大形羊齒草本ニシテ冬ハ葉枯ル。根莖ハ傾臥シテ舊葉柄本ヲ着ク。葉ハ叢生シ裸葉孢子葉ノ兩様アリテ一株ヨリ出ヅ。葉柄ハ粗大ニシテ強剛、下部ニ淡褐色又ハ褐色ノ大形披針形鱗片ヲ有シ、上部ハ葉ノ中脈ト同ジク小形ノ鱗片ヲ密布ス。裸葉ハ高サ70cm-1.5m許、洋紙様草質、葉面長卵形又ハ長橢圓形ニシテ單羽狀ヲ成シ、上部ハ急ニ狭窄シテ尖リ數對ノ羽片集合シテ長三角形ヲ形成ス。羽片ハ開出シ長橢圓形ニシテ鋭尖頭ヲ成シ、極短ノ小柄ヲ有シ、羽狀ニ尖裂或ハ深裂シ、裂片ハ長橢圓形、鈍頭・鈍頭或ハ圓頭ニシテ細鋸齒アリ。孢子葉ハ秋時裸葉ノ中心ヨリ出デテ裸葉ヨリ短ク長柄ヲ有シテ一方ニ傾キ、羽片ハ側向シ多數相接シテ線形ヲ呈シ、其内卷セル紫黒褐色ノ片内ニ囊堆ヲ包ム、冬季裸葉ハ枯死シテ朽腐スルモ此孢子葉ハ次年ニ枯残ス。和名犬雁足ハがんそく即チくさそてつニ似テ粗大ナルヨリ云ヒ、大かぐまハ大形羊齒ノ意、蛇がんそくハ蛇ノ棲ム處ニ生ズル羊齒ノ意、犬草蘇鐵ハ犬雁足ト同意、何時迄草ハ長ク殘ル其孢子葉ニ基キシ稱ナリ。漢名 狗脊 (誤用)

第 2875 圖

うらばし科




なよした  
*Cystopteris fragilis* Bernh.  
(= *Polypodium fragile* L.)

比較的稀品ニ屬シ高山地帯ノ岩間ニ生ズル多年生ノ小羊齒草本、冬月ハ其葉枯死ス。根莖ハ小形。葉ハ多數叢生シ、高サ15-25cm、軟キ草質ナリ。葉柄ハ纖長ニシテ質脆ク、多少紫赤色ヲ帯ビ、下部ニ長卵形又ハ披針形ノ淡褐色小形ノ鱗片ヲ帶ブ。葉面ハ再羽狀ニシテ卵狀披針形ヲ成シ鋭尖頭ヲ有シ、羽片ハ三角狀長卵形ヲ成シ、銳頭ニシテ短柄ヲ有ス。裂片ハ卵狀長橢圓形ニシテ剪裂シ且鋸齒アリ。囊堆ハ小形ニシテ葉ノ裏面ニ散生シ小脈上ニ着キ、尖卵形ヲ成セル膜質ノ苞膜ヲ具ヘ基部ヲ以テ小脈ニ着キ、囊堆ノ下ヨリ出デテ之ヲ掩ヒ後テ反轉ス。和名ハ弱羊齒ノ意ニシテ全草菲薄脆弱ナレバ斯ク云フ。

第 2876 圖

うらばし科



ふくろした  
*Woodsia manchuriensis* Hook.  
(= *Physematum manchuriense* Nakai.)

山地ノ稍濕潤ナル岩崖或ハ岩罅ニ生ズル多年生ノ小羊齒草本ニシテ全體質脆弱ニシテ折レ易ク冬月ハ其葉枯死ス。根莖ハ小形ノ塊狀ニシテ多數ニ葉ヲ叢生ス。葉ハ長サ20-35cm許アリ、淡綠色ニシテ膜狀草質ヲ呈シ、葉柄ハ短クシテ葉ノ中軸ト共ニ光澤アリ、柄本ハ黃赤色ヲ呈シ、少數ノ淡褐色披針形ノ鱗片ヲ有ス。葉面ハ長橢圓狀披針形ニシテ鋭尖頭ヲ有シ、單羽狀ヲ成シ、羽片ハ無柄ニシテ長橢圓形又ハ長三角形ニシテ羽狀ニ深裂シ、裂片ハ長橢圓形、圓頭ヲ有シ殆ド全邊ナリ。囊堆ハ各裂片ノ基部ニ近ク乃至四箇ヲ生ジ、略ボ球形ノ囊狀ヲ成シテ頂ニ齒縁ノ一孔アル白色ノ苞膜ヲ有ス。和名ハ囊羊齒ノ意ニシテ其囊堆ノ苞膜囊狀ヲ成セルヨリ云フ。