

きよすみこけしのぶ  
Hymenophyllum oligosorum

Makino.

我本州中部ニ於ケル山中林下ノ樹皮面ニ着生シテ群ヲ成セル常緑ノ小形羊齒草本。根莖ハ質硬クシテ暗褐色ヲ呈セル絲狀ニシテ横走シ、鬚根ヲ發出ス。葉ハ根莖ニ疎生シテ立ち、葉柄ハ葉面ヨリ短クシテ絲狀ヲ成シ、唯上部ニノミ狹翼アリ。葉面ハ廣楕圓形、圓頭、長サ2-4cm、硬キ膜質ニシテ乾ケバ暗色ト成リ、中軸ニハ翼ヲ有シ、密ニ再羽狀ニ深裂シ、羽片ハ短クシテ相重ナリ、小羽裂片ハ小形ニシテ二裂シ、最終裂片ハ線狀長楕圓形、鈍頭、全邊、幅2mm、其中脈ニハ鱗片アリ。囊堆ハ之レヲ生ズルコト少ク僅ニ葉頭ニ數箇ヲ見ルノミ、苞膜ハ二片アリテ圓形ヲ呈シ囊堆ヲ包ミ、前縁僅ニ嚙痕ヲ有セリ。和名ハ清澄苔忍ニシテ最初安房國清澄山ニ發見採集シ斯ク名ケシナリ。

こけしのぶ科



第 2884 圖


ほそばこけしのぶ  
Hymenophyllum

Blumeanum Spreng.

(=H. pycnocarpum v. d. Bosch;  
H. polyanthos auct. non Sw.)

深山陰地ノ地面・岩上或ハ老樹上ニ生ズル多年生ノ小羊齒草本ニシテ群ヲ成シテ生ジ淡褐ヲ帯ビシ緑色ヲ呈シ、乾ケバ赤褐色ト成ル。根莖ハ暗褐色ノ硬キ絲狀ニシテ長ク横走シ、鬚根ヲ出セリ。葉ハ極メテ疎ニ根莖ヨリ出デテ直立シ、有柄ニシテ高サ10-15cm許、硬キ膜質ヲ成シ、葉柄ハ纖細ナル針線狀ニシテ硬ク暗褐色ヲ呈シ、極メテ狭キ翼ヲ有ス。葉面ハ卵狀菱形又ハ廣披針形ニシテ、再羽狀ヲ成シテ細分シ、羽片ハ互生シ卵狀披針形或ハ長楕圓形ヲ成シ、小羽片ハ楔狀卵形ヲ呈シ、最終裂片ハ線狀ニシテ幅0.5mm許、微凹頭ヲ成ス。囊堆ハ最終裂片ニ頂生シ、小ニシテ圓形ヲ成シ、幅1mm許ナル二瓣ノ苞膜アリ。和名ハ細葉苔忍ノ意ニシテ其葉細ク狭裂セルヨリ云フ。

こけしのぶ科




第 2885 圖

うちはごけ  
一名 まるばほらごけ

Trichomanes parvulum Poir.

我邦中部南部諸州山地ノ岩上又ハ樹上ニ群集シテ着生スル多年生ノ常緑小羊齒草本。根莖ハ絲狀ニシテ長ク横走シ、黒色ノ細毛ヲ密生シ、又同じク細毛アル鬚根ヲ生セリ。葉ハ小形ニシテ疎ニ根莖ヨリ出デ、葉柄ハ纖細ナル絲狀ニシテ長サ1cm許、葉面ハ小形ニシテ圓形、腎臟形或ハ扇形ヲ成シ、直徑約1cm内外、深綠色ニシテ膜質ヲ呈シ、扇狀ニ深裂乃至尖裂シ、裂片ハ更ニ淺裂シ、小裂片ハ線狀、鈍頭ヲ呈シ全邊ニシテ各一小脈ヲ容ル。囊堆ハ一葉ニ一乃至數箇ヲ生ジ、他ヨリ低キ小裂片先端ニ生ジ、總苞即チ苞膜ハ圓筒狀ヲ成シテ其口縁少ク擴ガリ。和名ハ團扇苔ノ意ニシテ其葉圓形ニシテ團扇ノ如ク、又小形ニシテ宛モ苔ノ如ケレバ云ヒ、團扇洞苔ハほらごけノ類ニシテ其葉圓形ナレバ云フ。

こけしのぶ科



こかねしのぶ

一名 ほらごけ・ほらしのぶ・はひほらごけ  
Trichomanes orientalis C. Chr.  
(=T. japonicum Franch. et Sav.)

中部並ニ其以南ノ山地ノ陰濕ノ處ニ群ヲ成シテ生ズル多年生ノ常緑羊齒草本。根莖ハ長ク横走シ、細紐狀ニシテ黒色ノ細毛ヲ密生シ、鬚根ヲ出セリ。葉ハ疎ニ根莖ヨリ生ジテ長柄ヲ有シ、葉ノ中軸ト共ニ葉柄兩側ニ著シキ翼ヲ有シ往々皺曲ス。葉面ハ葉柄ヨリ長クシテ長サ10-20cm許、卵狀披針形ヲ成シ三回乃至四回羽狀ニ全裂シ、質薄クシテ稍透光シ、黄綠色ニシテ乾ケバ初メ綠色、後遂ニ變ジテ褐綠色ト成リ、羽片ハ互生シテ卵形或ハ長卵形ヲ成シ、小羽片モ亦互生シテ楔狀卵形ヲ呈シ、最終裂片ハ線狀長楕圓形、鈍頭ニシテ全邊ナリ。囊堆ハ裂片ノ末端ニ生ジ、總苞即チ苞膜ハ圓筒狀ヲ呈シテ口縁少ク擴ガリ、下半部ハ兩翼狀ヲ成セル葉肉内ニ入り、床柱ハ纖細ニシテ長ク超出シ、往々筒部ノ三倍長ニ達ス。和名黄金忍ハ其黄綠色ヲ呈セル葉質ニ基キテ云ヒ、洞苔並ニ洞忍ハ岩洞内ニ生ズルヨリ云ヒ、這洞苔ハ其根莖匍匐スルヨリ云フ。

こけしのぶ科



あをほらごけ

Trichomanes bipunctatum Poir.

(=T. Filicula Bory.)

中部並ニ其以南ノ山中陰濕ノ地ニ小群ヲ成シテ生ズル多年生常緑ノ小羊齒草本。根莖ハ黒色ノ絲狀ヲ成シ横走シテ密ニ黒色ノ細毛ヲ被リ、同じク黒毛アル鬚根ヲ出セリ。葉ハ疎ニ根莖ヨリ生ジ、葉柄ハ葉面ヨリ短クシテ其中軸ト共ニ兩翼ヲ有シ往々皺曲ス。葉面ハ卵形或ハ卵狀長楕圓形ヲ成シ、長サ3-5cm、三回羽狀ニ深裂シ、羽片ハ卵形或ハ卵狀披針形ニシテ互生シ、小羽裂片ハ楔狀倒卵形ヲ成シ、最終裂片ハ線形ニシテ鈍頭、全縁、葉質ハ薄クシテ深綠色ヲ呈シ、乾クモ尙其色ヲ保チ、光ニ翳セバ葉肉内ニ多數ノ短線形偽脈アルヲ見ルベシ。囊堆ハ羽片ノ頂部ヲ除キタル裂片上ニ着キ、總苞即チ苞膜ハ倒圓錐狀ニシテ兩唇ハ稍三角狀卵形、縁部ニハ偽脈アリ。床柱ハ總苞ヨリ長ク突出ス。和名青洞苔ハ其葉ノ特ニ深綠色ナルニ基キテ云フ。

第 2887 圖

こけしのぶ科



第 2888 圖

うらじろ

一名 やまくさ・ほなが・もろむき・しだ・へご  
Gleichenia glauca Hook.

(=Polypodium glaucum Thunb.; Dieranopteris glauca Nakai; G. longissima Bl.)

暖國ノ山地ニ生ジ通常乾燥シタル地域ニ大群落ヲ成ス大形常緑ノ多年生羊齒草本。根莖ハ粗大ナル針線狀ニシテ長ク横走シ、質硬ク赤褐色披針形ノ鱗片ヲ密生シ、疎ニ葉ヲ生ズ。葉柄ハ硬クシテ光澤アル茶褐色ヲ呈シ中心ニ一條ノ維管束ヲ通ズ。葉面ハ葉柄ノ上端ニ於テ雙出シ左右ノ二葉ト成ル、各葉ハ披針形ニシテ二回羽狀ニ深裂シ、上面ハ光澤アル綠色、下面ハ白色ヲ呈シ、最終裂片ハ全邊ナリ。初夏、葉ノ裂片ノ裏面ニ囊堆ヲ生ジ裸出シタル黄綠色ノ四子囊ヨリ成リ、彈環ハ横周ス。左右兩葉ノ中間ニハ鱗片ヲ帯ビタル芽ヲ有シ延長シテ又其先端ニ左右ノ二葉ヲ生ジ、此ノ如クニシテ其能ク成長セル者ハ數段ヲ成シテ高サ2-3mニ達スル者アリ。此種ハ其葉ヲ新年ノ裝飾ニ用キ、又葉柄ヲ箸・盆等ノ製作ニ使用ス。和名裏白ハ葉裏白色ヲ呈スレバ云ヒ、山草ハ山地ニ生ズルヨリ云ヒ、隠長ハ其葉長形ナルヲ以テ云ヒ、諸向ハ二葉對出セルヨリ云ヒ、しだハ下垂ルノ意ニシテ其葉ノ撓下セル狀ニ基キテ云ヒ、へごハ琉球語ヒグノ轉ナリト謂ハル。

うらじろ科

