第3215圖

そけい（素馨・耶悉茗）

一名　つるまつり

Jasminum grandiflorum *L.*

（=J. officinale *L.* var. grandiflorum *Kobuski* 〔1932〕）

常綠灌木、高サ 1m ニ達ス、竪ハ直立或ハ柔弱蔓ノ如ク、無毛或ハ稍然リ、細長、4 稜、平滑、綠色。葉ハ有柄、對生、7—10cm 長、奇數羽狀、綠色。小葉ハ 2—4 對、無柄、下部ノ者極短小柄アリ、楕圓形、卵狀楕圓形、鋭頭、糙澁緣、上端 3—5 小葉ハ連合シ其頂生葉ハ卵狀披針形、鋭尖頭、葉軸ハ綠色、平扁、或ハ有翼。花序ハ腋生或ハ頂生ノ小枝端ニ四生聚繖總ク數花ヲ着ケ、苞ハ小形、對生、鈍頭。花ハ短小梗アリ、夜間ニ開キ有香。萼ハ裂片 5、花冠筒ヨリ短、長キ線狀鋭形、斜開出、6mm 長、或ハ花冠筒ノ半長、宿在。花冠ハ白色、敍部ハ平開、星狀、2cm 徑、裂片ハ 5、楕圓形、鈍頭、微尖頭、筒部ハ 18mm 長、謝落。雄蕋ハ 2、花冠筒中ニ閉在、筒ニ着生、花絲ハ短、白色、葯ハ直立、廣線形、2 胞、內向、黃色。子房ハ 1、花柱ハ頂生、直立、下部淡綠色、上部放大棍棒狀、黃色、柱頭ハ 2 縱裂、花柱ハ黃色。蒴果ハ卵圓形、無毛、黑熟。我邦ヘハ文政 7 年ニ蘭人將來、又享和 2 年ニ琉球ヨリ薩摩ニ來ルト謂フ、今日邦內ニ見ルコト極テ稀。夏秋ノ候開花、熟帶地ニハ終歲花アリ。元來印度ひまらや山ニ野生、同國並ニべるしや等ニテハ通常栽培セラル、支那ノ廣東地方ニテハ盛ニ培養シテ其花ヲ賞シ、或ハ首飾頭飾トシ、又香油香水ノ原料トス、又花ヲ茶ニ交ユ。和名ハ素馨ノ音、又蔓茉莉ト呼ブ、素馨ハ本ト支邦ニテ美女ノ名ナリ、耶悉茗ハ又郁悉茗、野悉蜜ト書キ Jasmine ノ音譯ナリ、俗ニ Spanish Jasmine, Italian Jasmine, Royal Jasmine 等ト呼ブ。圖鑑第 651 圖ヲ今改正セリ。

第3216圖



うすぎもくせい

Osmanthus fragrans *Lour.* var. Thunbergii *Makino*

（=Olea fragrans *Thunb.*）

昔時蓋シ支邦ヨリ渡來ノ常綠喬木。幹ハ直立、高サ凡 4m ニ達シ、徑 30cm 許、主枝上昇、多枝、樹頭圓シ、小枝ハ對出、灰褐色、無毛、小縱裂痕並ニ小皮目散在。葉ハ對生、有柄、長楕圓形或ハ廣披針形、鋭尖頭、鋭底、全邊或ハ少鋸齒緣、革質無毛、上面綠色、光澤、下面淡綠色、8—13cm 長、25—49mm 幅、中脈ハ淡綠色、下面ニ隆起、支脈ハ羽狀、斜上、前方ニ弓曲、下面ニ隆起、葉柄ハ前面有溝。10 月ニ開花、さんもくせいヨリ香氣淺シ。花ハ兩性（或ハ雌性乎）、葉腋ニ集合、繖形、小梗ハ綠狀、淡綠色。萼ハ細微、不齊ニ 4 裂、裂片綠ニ不齊細齒アリ、白綠色、薄質、無毛。花冠ハ白黃色、4 深裂、裂片ハ倒卵形、圓頭、凹面、厚質、謝落、筒部最短。雄蕋ハ 2、花冠筒部ニ着生、短花絲、葯ハ大、圓形、2 胞、內向、葯隔短闊、花粉黃色。雌蕋細小、1.5mm 長、子房ハ能ク發達、小形、卵形、約 1mm 徑、淡綠色、平滑無毛、花柱ハ最短、柱頭ハ大形懸著、菌樣頭狀、黃白色。果實ハ核果、5 月成熟、楕圓形、凡 2cm 長、11—13mm 徑、有梗、下垂、暗藍毛、果肉ハ稍厚ク、軟質、綠色、核ハ舫蓮形、堅硬、淡褐色、縱道脈アリ。種子ノ皮ハ褐色、膜質、胚乳ノ中央ニ胚アリ。此兩性花ヲ有スル結實種ハ之レヲ同種中ノさんもくせい（關東地ニ多シ）、ぎんもくせい（關西地ニ多シ）ニ比スレバ世間ニ見ルコト鮮ナシ。和名ハ淡黃木犀ノ意ニシテ花色ニ基キ、予ノ命名。

ひらぎもくせい

Osmanthus Fortunei *Carr.*

（=O. japonicus *Sieb.*）

常綠喬木、4m 高ニ達シ、樹頂ハ圓シ、多枝、繁葉、幹ハ直立、30cm 徑ニ及ブ、樹膚面ニ栓質瘤散在、大枝ハ上向、圓柱形、無毛、灰白色、小皮目散在。葉ハ開出、有柄、小枝ノ末ニ集リ、10字樣對生、楕圓形、短鋭尖頭、鋭底、葉面稍背ニ撓ム、葉緣ノ三稜狀刺齒ハ兩緣ニ各 8—10、稍葉ハ往々刺齒少數、或ハ全邊、硬革質、無毛、上面深綠色、光澤、下面淡綠色、5—12cm 長、3—7cm 幅、中脈ハ下面ニ隆起、側生支脈ハ兩側ニ各 8—10 條、斜上、微ニ上下面ニ隆起、細脈ハ外見不明、葉柄ハ 6—13mm 長、無毛、前溝アリ。花序ハ腋生、時ニ頂生。花ハ雄性、白色、有香、8—10mm 徑、花梗ハ束生、繖形、花ヨリ長ク、綠狀、綠色、5—11mm 長、鱗片ハ細小、卵圓形、背稜アリ。萼ハ細小、淺皿形、四裂、裂片ハ卵形、或ハ卵圓形、微嚙齒緣。花冠ハ 4 深裂、裂片平開、往々微背反、倒卵狀楕圓形、或ハ長楕圓形、圓頭、全邊、稍厚質、筒部極短。雄蕋 2、花冠筒部ヨリ直立、花冠裂片ヨリ短シ、2.5—3mm 長、花絲ハ綠狀、葯ヨリ微長、葯ハ廣楕圓形、葯隔闊大。雌蕋ハ不熟、直立、卵狀鋭形、鋭頭、綠色。本品ハ唯雄本アリテ雌本ヲ見ズ、蓋シひひらぎトぎんもくせい（O. fragrans *Lour.* var. latifolius *Makino*）トノ間種ナラント推定セラル、樹ノ出現由來ハ全ク不明、邦內ニ野生ナク唯人家ノ庭園ニ見、亦生垣ニ利用セラルルノミ、樹ノ成長セル者能ク花ヲ着ケ 10月ニ開ク。和名ハひひらぎニ類似スルもくせいノ意ナリ。

こやすのき

一名　ひめきしみ

Pittosporum illicioides *Makino*

（=P. illicifolium *Makino*; P. glabratum *Koidz. non Lindl.*）

常綠灌木、分枝、凡 2mm 內外、小枝ハ細長、無毛、褐灰色。葉ハ小枝頭ニ集着、有柄、互生、倒卵形、倒卵狀長楕圓形、或ハ倒卵狀披針形、急殺、鋭尖頭、下方狹窄、楔形、全邊、薄革質、無毛、上面綠色、平滑、下面淡綠色、3 年間枝上ニ在リ、4—9.5cm 長、2—5cm 幅、中脈ハ下面ニ隆起、多支脈羽狀、葉柄無毛、5—15mm 長。花序ハ新枝頭ニ繖形、葉ヨリ短、疎ニ 2—10 花、花梗眞直、絲狀、無毛、平開或ハ斜開、14—30mm 長。雌雄異株。花ハ 2 家、7mm 長、8mm 徑、黃色。5 月開花。萼片ハ 5、小形、卵形、鈍頭、時ニ綠色、2—3mm 長、淡綠色。花冠 5 瓣、筒狀鐘形、上部平開、後チ多少反曲、跛形、圓頭、全邊、下部狹窄。雄蕋 5、直立、花瓣ヨリ短、無毛、雄花ニテハ雌蕋ヨリ長ク 7mm 長、雌花ニテハ雌蕋ヨリ短ク 5mm 長、花絲ハ粗絲狀、葯ヨリ長、葯ハ 3 角狀卵形、鋭頭、2 胞、內向、黃色、雄花ニテハ 2.5mm 長、黃花粉、雌花ニテハ 1.5mm 長、無花粉。子房直立、倒卵形、細毛アリ、2mm 徑、淡綠色、一胞、3 心皮、側壁胎座、卵子略ボ多數、花柱頂生直立、粗大、子房ヨリ短、柱頭ハ雌花ニテハ平頭形、雄花ニテハ頭狀ナラズ、蒴果ハ短倒卵形、3 溝瓣、基部多少小柄狀、12mm 長、平滑、革質、3 心皮、胞間開裂、內面粘質、種子露出。種子ハ圓形或ハ廣楕圓形、赤色假種皮ヲ被フリ胎座ニ着ク。本種ハとべら屬ノ稀品、僅ニ播磨ニ見ル、他處ノ產地未詳、支邦ノ P. glabratum *Lindl.* トハ全ク別種、其種ハ綠狀披針形葉、12—18mm 長ノ綠黃色花、繖房花序、2.5cm 長ノ卵狀長楕圓形蒴果ヲ有スル。和名子安の木ハ德川時代ヨリノ稱、此樹ハ迷信的ニ安產ノ呪禁ニテモ用チシ乎、其由來今全ク不明、えごのきモ亦子安の木ト云ウ、同名ナリ。

第3218圖



ひめあぢさゐ

Hydrangea macrophylla *Seringe* subsp. serrata *Makino* var. amoena *Makino*

（=H. serrata *Seringe* var. amoena *Sugimoto*）

落葉灌木、高サ 235cm 許ニ達ス、株本ヨリ叢生、多キハ凡 20 本ヲ數フ、株本ノ幹ノ直徑 18cm 許、幹ハ直立、下部往々疎ニ分枝、圓柱形、平滑、無毛、暗灰色或ハ灰色、今年ノ者ハ綠白色、日光ヲ受レバ紅紫色ニ染ム、直徑 4—10mm 許、紫色ノ皮目ヲ散布ス、髓ハ白色、大形、柔質、腋芽ハ卵狀長楕圓形、鋭頭。葉ハ有柄、對生、12—28cm長、6—16cm 幅、廣楕圓形、短鋭尖頭、鋭底、鋸齒緣（鋸齒ハ三角狀卵形、微凸頭、一條細脈）、下緣ハ無鋸齒、薄質、無毛、表面ハ綠色、稍光澤、晚秋往々帶紺色、陷凹鏤樣ノ脈絡、裏面ハ淡綠色、隆起網狀ノ脈絡アリ、中脈ハ强壯、白綠色、支脈モ白綠色、細脈亦隆起網狀。葉柄ハ淡綠色、圓柱形、前面ハ極淺溝、基部ハ擴大、枝ニ抱着、2—9cm 長、3—5mm 徑。花ハ前年幹ヨリ出デシ今年ノ枝端ニ咲ク、花ハ皆胡蝶花ヨリ成リ多少扁平ナル毬形、10—20cm 徑、優美ナル藍色、毬中ニ往往小形ノ正常花ヲ交ユ、花毬ハ細毛アル多小梗并ニ一總花梗ヲ具ヘ、花後宿存シテ秋ニ至リ色ハ綠變ス。各胡蝶花ハ多數密ニ群集、有小梗、2—4cm 徑、不登花、多クハ四萼片、時ニ五萼片、無柄、平開、覆瓦狀、圓形、廣楕圓形、鈍頭、圓頭、微凹頭、鋭底或ハ圓底、全邊、薄質、扇狀脈。正常花ハ有小梗、細形謝落ノ 4—5 萼片、4—5 花瓣謝落、十雄蕋、三花柱、楕圓形無毛ノ下位子房、種子碎小多數。本種ハ庭內ノ栽植品ニシテ未ダ野生ヲ見ズ、邦內ニ廣ク分布スル、凡四千年前早ク本邦ヲ發見シ注意セシハ予ニシテ最初信州戶隱山下ナル農家ノ庭ニ之レヲ認メ、後チ奧羽地方、關西地方等ニモ之レヲ見テ採集セリ、從來無名ナリシヲ以テ予ハ始メテ之レヲ姬あぢさゐト名ケタリ、花ハ普通ノあぢさゐニ比スレバ女性的ノ優美ヲ示シ頗ル可愛ニ見ユ。

第3219圖



けきつねのぼたん

Ranunculus polycephalus *Makino*

（=R. japonicus *Langsd. non Thunb.*; R. Vernyi *Franch. et Sav.* pro parte）

野外田間ノ濕地ニ生ズル越年生ノ直立草本、高サ凡 45—60cm 許、體上ニ毛ヲ有ス。莖ハ通常少數叢生、對生的ニ疎ニ分枝、圓柱形、中空、綠色。根生葉ハ長柄、柄本ハ鞘ヲ成ス、3 小葉ニ分レ、小葉ハ 2—3 尖裂、不齊鋸齒緣。莖葉ハ互生、短柄、3 全裂、柄本ハ鞘ヲ成ス、小葉ハ 3—5 尖裂、裂片ハ卵狀長楕圓形、不齊鋸齒緣。春夏ノ候各梗頂ニ黃花ヲ開ク、花徑 12mm 許、蕾蕾ハ球形、萼片之レヲ包ム。萼ハ 5 片、下方ニ反曲、凹面、草質、淡綠色、外面ノ上方ニ毛アリ。花瓣ハ 5、平開、瓣面光澤、細縱脈、倒卵狀長楕圓形、圓頭、全邊、基部ニ 1 細微鱗片アル蜜槽ヲ有ス。雄蕋ハ子房下生、多數、黃色、花絲ハ綠狀、葯ハ楕圓形。雌蕋ハ多數集合、子房ハ無柄、長卵形、花柱ハ短、略ボ直尖。瘦果ハ 5、6 月ニ熟ス、多數、凡 10mm 徑ノ球形ニ集合、楕圓形、平扁、無柄、無毛、綠色、先端ノ短小嘴ハ多少曲レドモ略ボ眞直、味辛シ、熟シテ散落シ水面ニ落レバ浮ンデ流ル。6 月頃通常莖葉枯死シ秋ニマデ殘ラズ。本種ハ有毒植物ノ一、形狀きつねのぼたんニ類似スレドモ主トシテ體上ニ毛多ク、且瘦果ノ嘴ハ略ボ直ニシテ强ク鉤曲セザルヲ以テ容易ニ區別シ得、而シテ此種ハ山地溪流ノ邊ニハ生セズ、唯開闊ナル田間ニ見ルノミ。和名ハ毛アル狐ノ牡丹ノ意。