

第3233圖



まるばにくけい

一名 かうちにくけい

*Cinnamomum sericeum* Sieb.

(=*Laurus sericea* Blume;

*C. daphnoides* Sieb. et Zucc.)

我邦暖地ニ栽植セル常緑喬木ニシテ枝葉ク葉密ナリ。小嫩枝ハ四稜淡緑色ニシテ白細毛ヲ帯ブ、枝ハ円柱形ニシテ褐色無毛。葉ハ小形、対生或ハ斜対生、短柄アリ、倒卵形、円頭、下部楔形、全辺、厚質、上面ハ緑色ニシテ稀薄ニ細臥毛ヲ散布シ、下面ハ絹様細毛ヲ密布シテ白色ヲ呈セリ、主脈三条縦通シ、細脈ハ外見シ難シ、葉長2—4cm 葉幅1—2cm 葉柄ハ細毛ヲ帯ビ前溝アリ。花序ハ腋生ノ長梗ヲ有シテ其頂端ニ3—7花ヲ集着ス。果実ハ漿果、極短ノ小梗ヲ具フ、広楕円形平滑無毛、始メ緑色、後チ黒熟ス、長梗ノ末端ニ1—3個、下部ハ杯状厚質ノ宿存萼ヲ伴フ、果中ニ無胚乳ノ大ナル種子アリテ肥厚セル子葉ヲ有シ、幼葉ハ細小ナリ。肉桂ノ類ニシテ葉ノ円味ヲ帯ブル故ニ円葉肉桂ト云フ。

第3234圖



つるかうぞ

一名 むきみかづら

*Brousonetia Kaempferi* Sieb.

落葉灌木。枝条ハ褐色ノ蔓状ニテ自由ニ延長シ他物ニ攀繞シ密キ者ハ細毛ヲ帯ビ、切レバ白乳液ヲ滴下ス。葉ハ互生、有柄、長卵形或ハ広披針形、分枝セズニテ單形、斜円底或ハ心臟状底、鋸齒縁、洋紙質、上面ハ緑色、糙波、下面ハ淡緑色、短毛ヲ布ク、中脈支脈細脈ハ隆起網状、支脈ハ疎ニシテ羽状、斜上、内方ヘ弓曲ス、托葉ハ披針形、銳尖頭、膜質、一脈、細毛ヲ帯ビ、天落。雌雄別株。花候ハ春季、花莖ハ有柄、腋生、淡緑色。雄花莖ハ長楕円形多数ノ小花ヲ密着シ、穂末ヨリ開キテ下方ニ及ブ。花ニハ小苞アリ。萼ノ下部ハ短筒状、上部四裂シテ開ク。雄蕊ハ四、花絲ハ白色、線長、葯ハ二内向、白色ノ花粉ヲ釋出ス。雌花莖ハ球状、豌豆大、萼ハ長胞、壺状、短細毛アリ、一子房ハ萼内ニ潜居、絲状ノ一花柱長ク出テ紅紫色。果実ハ小形、穗状ニ集リ丹色ニシテ味甘クかうぞノ果実ト相同ジ。九州ニ産シ、山地ニ見ル。つるかうぞハ蔓状ア成スかうぞノ意、むきみかづらハ茎ニ刺キ身蔓ニシテ裸出セル果実ノ意ナラン。樹皮ニテ紙ヲ製シ得ベシ。

第3235圖



がじゅまる

*Ficus retusa* L.

常緑喬木ニシテ大樹ト成リ葉密ニ繁リテ樹蔭多シ、枝葉ハ全然無毛。枝ハ円柱形、輪状ノ節アリ。葉ハ互生、有柄、広倒卵形、或ハ長倒卵形、或ハ倒卵状長楕円形、短銳尖頭ニシテ末端ハ鈍形、下部ハ往往略ハ楔形、基部ハ鈍形或ハ略ハ銳形、全辺、厚質、上面ハ緑色光滑、下面ハ淡緑色、4—10cm長、2.5—4.5cm幅、中脈ハ下面ニ隆起、支脈ハ纖細、多数、羽状、斜走、葉縁ノ附近ニ沿フテ走ル支脈ニ節合ス。苞ハ卵形、天落。葉柄ハ粗大、6—18mm長、上部ニ狭キ前溝アリ。閉頭果ハ倒卵状球形、凡ソ9mm径、無柄、葉腋ニ一類或ハ二類、基部ニ一類ノ大形ノ三苞片ヲ具ヘ、果面ニハ斑点ヲ散布ス、果中ニ多数ノ雌花雌花ヲ閉入ス。暖地ノ産ニシテ我邦版図内ニテハ九州薩南ノ種子ヶ島ニ於テ大木ニ成長シ往々參差タル褐色ノ氣根ヲ樹上ヨリ垂ル、固ヨリ昔植栽セル者ナリ、九州ノ本島並ニ四国ニハ之レヲ見ズ。がじゅまるハ琉球ノ土語又ガじまる、かすまる等ノ名もある。同地ニテハ此材ヲ以テ盆等ヲ造ル。

牧野

日本植物圖鑑

増補

昭和30年12月

MAKINO'S ILLUSTRATED FLORA OF JAPAN

1955

(Supplement)

理學博士 牧野 富太郎

分擔執筆者

理學博士 前川 文夫

理學博士 原 寛

理學博士 津山 尚

北隆館