

おきなだんちく

一名ふいりのせいようだんちく

*Arundo Donax L.*

var. *versicolor Stokes*

大形の多年生草本で、歐洲原産品の白斑葉品であり、観賞用に栽培される。地下茎は太く短く匍い、叢生する稈は直立して高さ1.5-2mに達し、中空で、葉面は長く、長さ30-60cm、巾2-7cm許もあり、上半は彎曲垂下し、縁は粗澁し、葉基は耳状をなして茎を抱く。年を経た稈は質が硬く、節から多く枝を生じて葉を多く出す。新葉には白色の縦条があって美しいが、夏を過ぎると縦条は次第に緑色となる。秋に稈頂から大形の円錐花序を出して無数の白紫色の穎花をつける。本邦に自生するダンチクに比して全体肥大であり、花序の枝は稍太く、小穂も亦少しく大形である。和名オキナダンチクは翁ダンチクの意である。



第 3846 図

せいこのよし

一名せいとかよし

*Phragmites Karka Trinius*

(= *P. Roxburghii Steud.*)

河辺の湿地或は海辺に自生する大形の多年生草本。根茎は地中を横走し、稈は直立して高さ2-4m、巾2cm許に達しアシより太く、宛もメダケの様である。葉は狭長な披針形、質は強剛で先端は垂下せず辺縁は糙澁し、葉面は淡緑色を呈し、長さ40-70cm許あって、アシより長い。夏、稈頂に大形の円錐花序を出し、その長さ30-70cm、初め紫色後に褐色を呈する。小穂には数個の小花があり、小花の基部に関節があり、最下の小花は雌性で子房を欠き花下の甚だ短かい小軸に、白く長い絹毛がある。小穂はアシより小形で長さ5-8mm許。和名は西湖のヨシで、もと花戸の雅称。



第 3847 図

たちいちごつなぎ

*Poa nemoralis L.*

都会附近の川原の土手、路傍などに多い多年生草本で、多数叢生して高さ約15-25cmに達し匍枝はない。稈は直立して剛く、分枝せず、葉は狭線形で長さ3-6cm、葉鞘と共に毛がない。夏に稈頂に直立して概形披針形をなし長さ5cm許の円錐花序を出す。小穂はやや疎で灰緑色を呈し、扁平な楕円形長さ4-5.5mm許、2-4小花があり、各小花の下に関節がある。内外の穎は楕円形、又は狭卵形、3脈があり、内穎は稍大形で巾広く、長さ2.5-4m、先端は細く尖り背に竜骨があり、上方には短剛毛がある。外穎は長楕円形で先端稍と鈍形、薄膜質で5脈、背は竜骨をなし、下方脈上に短毛があり、基部に縮毛がある。



ほもの科

ぬまいちごつなぎ

*Poa palustris L.*

歐洲・北米など北半球の温帯一般に分布する多年生草本で、本邦では北海道、本州中北部の平地の河川、池沼の縁など湿地に帰化している。疎に叢生し、稈は直立するが、時に下方は膝曲し、或は短かく匍い、節から発根することがあり、基部以外では分枝せず、葉は葉鞘と共に無毛、狭線形で、長さ10-20cm、巾2-4mm許あり、全体軟質である。円錐花序は卵形又は長楕円形、長さ10-30cm、黄緑色稀に帯紫色、枝は輪生し下方は分枝せず、上方再三分岐し、初め箒状に集るが、後に広く開出して、小穂を疎に散ずる。小穂は扁平、卵形又は長楕円形、長さ3-5mm、2-5個の小花があり、小花の下に関節がある。内外穎は同形又は内穎がより大形、披針形又は狭卵形先端鋭尖し、粗澁する竜骨があり、長さ2-3mm許、3脈を具える。外穎は内穎と同長、竜骨があり、先端は通常黄褐色を呈し、5脈を具え、中脈は不明瞭、下方は縁の内方に側脈に沿って白色短毛がある。



第 3848 図

ほもの科

むかごつずり

*Poa tuberifera Makino*

本州、四国、九州の山地に生ずる多年生草本で、匍枝はなく、稈は軟弱平滑で高さ20-50cm許、基部の1-2節は短大で、卵形又は長楕円形に肥厚し白色を呈する。葉は狭線形で長さ10-15cm、巾2-4mm軟質で、葉鞘は下半は筒状に癒合し、背に稜がある。円錐花序は甚だ疎で、長さ10-15cm、側枝は双生し、後に開出し、小穂に長梗がある。小穂は扁平な楕円形で2-4小花を有し、内外の2穎は不同で、外穎は狭披針形内穎は3脈があり広倒披針形、外穎は3.5-4.5mm、穎より長く、長楕円状披針形、鋭頭、中肋及び側脈の下半に圧毛があり、基部に縮毛がない。



第 3849 図

ほもの科

やまとほしがら

*Festuca japonica Makino*

本州の山地に産する多年生草本で、稈は叢生して高さ30-70cm、葉は狭線形で軟弱長さ5-15cm、巾1.5-2.5mm許あり、稈は纖弱で、初夏に頂に大きく拡がった円錐花序を出し、その長さ40-60cm許、細い側枝を双生して開出し、小穂を甚だ疎に生ずる。小穂は長楕円形、長さ4-6mm、中に3-4個の小花があり、各小花の下に関節がある。2穎は膜質で披針形を呈し、外穎は長さ1.5mm、内穎は2.5mm許あり、外穎は長さ3-4mm許、鋭頭、トボシガラより小形であり、また無芒の点で異なる。



ほもの科